

multò faciliùs atque expeditiùs in putredinem vergit, si in a cervum congeratur, eò quod vapores intus exhalati, cum diffari nequeant, externi calidi putrefacientis vice fungantur.

XXXIII.

*Calor iste ambiens non primariò in humidum agit, aliàs id absumeret, & tunc humidum non dominaretur calori; sed in calorem rei internum, eumq; intendit, & paulatim ad exteriora una cum humido caloris vehiculo vocat.*

XXXIV.

*Præsens etiam calor, si internum foràs provocare debet, sit mediocris necesse est. Nimis enim remissus nunquam evocat. Intensior interiores partes torrefacit, ut calor intus manens fortius siccum, cum humido contineat, uti liquet in carnibus fumo induratis. Intensissimus combustioni ansam præbet.*

XXXV.

*In Putredine ergò eâ utitur methodo natura: 1. calor ambientis evocat calorem mixti naturalem, & sic ipsum corrumpere dicitur. 2. Corruptionem proprii caloris sequitur segregatio humidi & siccum, quæ tamen adhuc est sine formæ Essentialis perditione, sed nuda tantum ad putredinem existit præparatio. 3. Tanta intercedit dissolutio humidi, ut forma servatu impossibilis in momento destruat, & tunc separata manent humidum & siccum, quia non amplius arcto unionis naturalis vinculo conjugantur. 4. Humidum illud a calore consumitur, h. e. transmutatur in halitum, & cum calore evaporat, ut ita nil nisi terreum relinquatur.*

XXXVI.

*Partibus, quæ ad absolutam & integram concurrunt definitionem, prædeclaratis, nunc ὁρισμὸν τῆς ἕσθ' τῶν ὄρων διαφέροντα τῆς ἀποδείξεως ex humaniorum artium Phosphoro Arist. adscribimus: σὴ ψῖς ἐστὶ φθορὰ τῆς οἰκίας, καὶ κτ' φύσιν θερμότητ' ἐν ὑγρῷ ἐκάστῳ ἀπὸ τῆς ἀλλοτριᾶς θερμότητ' ἐν τῷ περιέχοντι.*

XXXVII.

*Jam in Putredinis species, si quæ dantur, inquirendum. Has cum Zabarellâ & aliis ignoramus. Una enim est Putredinis natura: ob variam tamen mistorû constitutionem aliqualis est diversitas, cujus gratiâ alia magis, aut minùs, alia penes totum, alia penes partem.*