

Theſis XXXVI.

*Anomalia*, quæ Alphonſinis & aliis Argumentum vocatur, *Anomalia* eſt vel prima vel ſecunda. Prima in Planetis anomalia ſimplex vel *liana*. Eccentrici dicta, eſt arcus Epicycli primi ab Apogeo contra ſignorum ſeriem, uſq; ad centrum Epicycli ſecundi numeratus. Vel arcus Eccentrici ab Apogeo ſecundum ſignorum ſeriem uſq; ad lineam motus mediis computatus. Ex hac anomalia Proſtaphæreſis elicitur, quæ in Lunâ proſtaphæreſis Epicycli, in planetis Eccentrici appellatur. Secunda ſic denominatur reſpectu primæ: Undè in Lunâ anomalia ſecundò ſeu ultimò *aquata*, in planetis anomalia orbis annua, vel anomalia commutationis dicitur. Ex hæc colligitur proſtaphæreſis ultima, quæ in Lunâ Proſtaphæreſis Eccentricitatis, in Planetis Proſtaphæreſis orbis absoluta nuncupatur.

Theſis XXXVII.

*Anomalia inſuper* vel eſt ſimplex, quæ in circulo parvo fixarum, vel in Epicyclo primo, vel in Eccentrico numeratur; de quâ ex antecedenti conſtat: Vel eſt duplex ſeu duplicata, quæ viciffim vel propria eſt, & in Epicyclo ſecundo, tam Lunæ, quàm planetarum computatur, vel analogica, quæ interſticiū luminarium duplex, Alphonſinis verò centrum Lunæ appellatur. Eſtq; arcus circuli parvi à centro mundi ſecundum ſignorum ſeriem, uſq; ad centrum Eccentrici, vel Arcus circuli parvi ab ejuſdem Apogeo ſecundum ſignorum ſeriem uſq; ad lineam motus medi lunaris computatus.

Theſis XXXVIII.

Motus ſtelle latitudinaris reponitur & ipſe in Zodiaco ac numeri Motus incipit vel à medio capitis nodo, ut in Luna nomenque ſimpliciter Latitudinis retinet; vel à principio Arietis, ut in Saturno, Jove & Marte, & ſpecialiter medius motus nodi Borei appellatur. Inferiores duobus promediis latitudinis motibus anomalias ſuas Eccentrici & orbis retinent.

B

Coronidis