

tans: aliquando in speculi, quandoque vero in eadem cum visu superficie, & nonnunquam retro visum. Atque hæc omnia contingunt pro varia objecti & oculi collatione, quæ, prout diversa fuerit, diversa quoque hæc sistit phænomena. Ut res clarius evadat, illustramus eam duobus iterum exemplis. Supponamus in casu fig. 4. A B esse speculum cayum, oculum vero nostrum collocatum esse inter centrum L, & superficiem speculi, in E, jam videbit hic objectum C D, remoto satis loco, & quidem eo semper remotiori, quo remotior oculus a superficie speculi intra centrum fuerit. Idem vero speculum A B in casu fig. 5. intuens oculus E, post centrum L positus, videt objectum C D, ante speculum in aëre pendulum in c d, & quidem (quod auget admirationem, præsentis vero loci non est,) inversum. Et hæc sunt primaria duo speculi cavi phænomena: reliquorum enim differentia non est aliunde, quam à majori, vel minori oculi & objecti a speculo distantia; juxta quam etiam deinde objecti imago vel proprius speculo, vel proprius visui conspicitur.

CAP. II.

Principia quædam demonstrandi præmittens.

§. I.

PErspectis hisce phænomenis, in caussas quoque illorum ac fundamenta inquiramus necesse est: priusquam vero illa consideramus, præsupposita quædam, ad melius illa percipienda, præmittenda videntur.

§. II. Sup-