

R. Herb. Majoran.

Marrub. alb.

Altheæ:

Malvæ

Flor. Chamæm. R.

Melilot. aa. Mj.

Sem. fœnic.

cumin. aa ȝiȝ.

Baccar. Lauri ȝij.

Incis. & contus. coq. in s. q. ▽ Simpl. huic linteæ vel spongia intincta intestinis applicentur. Huic si non cedant, punctura acus, vitando vaia sanguifera, emittantur, ut sic collapsa intestina citius reponi queant. Quod si vero hæc non sufficiant, vulnus sufficienter dilatetur, quod fit scalpello per specillum sulcatum prudenter immisso vel cultro occultato peculiari, novæ inventionis, cuius icon in Palfyni Chirurgia belgice edita Tab. III. videri potest, quo vulnus, pro necessitatis exigentia, vitando lineam albam, satis amplietur. Ut autem incisio eo melius & tutius peragatur, a ministro intestina reclinata linteis fomento quodam, vino, aqua vel lacte calido imbutis teneantur, ne inter sectionem intestina cultro lædantur, aut ab aëre exsiccentur, vel a frigore, quod facile fit, inflammatio & gangræna inducatur, quæ vero incommoda a cita repositione impudentur.

THES. XI.

Repositis ita intestinis vulnus interea a ministro comprimatur ne denuo prolabantur, postea ad ipsam operationem progressendum. Chirurgus itaque duas præparet acus incurvatas satis robustas & acutas, quibus unius filii robusti vel serici vel linei, cera, majoris firmitatis & durationis gratia, obducti, extremitates traductæ sint: una acu tunc labium dextrum altera sinistrum ab intra ad extra perforet, reliquo sufficientis longitudinis in vulneri filo ut ligari postea queat, talis filorum transmissio pro vulneris