

4

Dissertatio Physiologica
DE
MOTU VENTRICULI
ET
INTESTINORVM
PERISTALTICO

DEI TER OPTIMI MAXIMI AVXILIO,
GRATIOSISSIMÆ FACULTATIS MEDICÆ
LIPSIENSIS

CONSENSV,
SUB VM BONE
DN. D. CHRISTIANI MICHAELIS
ADOLPHI

DOMINI PATRONI ET PRÆCEPTORIS SVI OMNI
OBSERVANTIAE CULTV

PROSEQVENDI
D. XII. APRIL. A. S. R. MDCCXX.

H. L. Q. C.
PUBLICO EXAMINI EXPOSITA,
RESPONDENTE

CHRISTOPHORO SÜSSENBACHIO

Hirschbergensi Sileſ.

Dp. physiol V. 256


Physiol.
258,2.


LIPSIAE,
Litteris ANDREÆ MARTINI SCHEDII.

Intestina).

Notar. V.

Pl. Tit. Ge. Dr.





PRÆLOQUIUM.

Generato animali, ut vivat, crescat, atque perficiatur, nutritio ulterius accedat, requiritur, quæ non nisi generationis continuatio & renovatio est, atque quæ adeo inter se convenienter & similes sunt, ut opus sit easdem a se invicem discernere. Ambæ a fluido & molli incipiunt, & ad spissum, solidum durumque sensim sensimque progrediuntur. Ambas altilis quidam lymphaticus ingreditur succus. Non una enim nutritionis necessitas est, quæ & principii vitalis conservationem & particularum temperatarum dulcium ac benignarum & facile exsolubilium (quarum calculum curiose satis initit SANCTORIUS in medicina statica,) quæ quotidie deprædatorio calore & motu intus forisque separantur, dissolvuntur, immutantur, perduntur, & consumuntur, reparationem, solidarumq; partium firmationem, & ad solitam, convenientem, necessariamque magnitudinem & statu ram usque, omnium membrorum accretionem involvit. Ad hanc chylificatione debitum succum nutritum præbendo, suam confert operam. Hæc in ore inchoatur assumptis congruis alimentis, per salivæ commixtionem, comminutionem, masticationem, dentium maxime ministerio præparationem, & in ventriculo variorum rursus mediorum & instrumentorum ope, jam maxima ex parte continuatur & peragitur. In intestinis in primis in

duodeno ulterius perficitur (hinc ibi omnia sunt liquidiora) tandem exaltatur ac absolvitur penitus. Haec partes, nutritio-
nis origo, fons & radix existunt, unde convenienter satis
ARISTOTELES. 4. part. animal. 4. ventriculum, ter-
ræ proportione respondere voluit. Quemadmodum enim
terra plantis, sic ventriculus partibus animalibus, alimen-
tum subministrat, & **HIPPOCRAT.** belle dixit 4. de Morbis:
quoad homo vivit, ubi cibus & potus in ventriculum de-
ciderunt corpus ex Ventriculo haurit, hauriunt & fontes &
expleti corpori transmittunt. In his uti in aliis viget motus
quidam, peristalticus dictus, plus plusque in chylificatio-
nis negotio valens, atque hinc consideratione paulo ampliori
dignus. Quem laborem qualemque jam a nobis suscepimus
benevole accipiat L. B. Ne autem is sine auspiciis & favore
Summi in cælis Numinis, quod vitam & valetudinem mor-
talibus donat, moderatur atque tuetur, a nobis suscipiatur,
devota mente precamur, ut declarantibus nobis,
vires ex alto quam clementissime lar-
giatur.

§. I.



Omen (ut apud Platonem in Cratilo legitur)
rerum substantiam docendi, discernendiq;
instrumentum est: quare vocem, quam
Dissertationis præsentis frons gerit, prout
fert pene solennis observatio, exponamus
quoque, ut constent modo, ejus natales, qui
græca origine oriuntur, & audiunt cognato vocabulo, mo-
tus circumpressorius, qui coarctandi circumcirca vim ha-
bet. Haud multum absimili modo quoque peristole vo-
catur. Aliis motus vermicularis sub nomine venit, quia
vermium ad instar fæse contrahit. Ab aliis, motus testudi-
neus

neus appellatur. Vide CHARLETON. *exercit. physic. anatom.* III. Estque nempe motus, qui in oesophago jam incipit, ventriculo & intestinis maxime pressoria vi lumbrici reptantis instar, a partibus superioribus ad inferiores, mediantibus fibris undatur, volvitur, & alimenta in primis ore assumta ibique præparata in ventriculum dimittit, eademque maxime ibi soluta, digesta, ex eo in intestina & chylum perfectum in vasa lactea agit, scybala vero ex corpore ejicit &c.

§. II.

Scilicet officina chylificationis, canalis alimentorum & excrementorum: oesophagus, ventriculus, & longum intestinorum volumen ab orificio usque ad finem, per unum canalem & ductum continuatur, modo ut ventriculus sit pars intestinalium magis expansa atque amplissima, & intestina nil nisi ventriculus in arctum magis spatium contractus, ac in longos tubos extensus. Eadem enim constant substantia, eadem structura, eademque natura, eodem motu ejusdemque indolis liquore, qui exstilla, solvente, eodemque tandem officio gaudent. Totidem nimirum componuntur tunicis, eademque fibrarum serie collocata. Ad sunt enim singulis quatuor tunicae, quarum exterior tenuis est, & membranacea habetur, nerva potius dicenda, cum ex meris omnino fibris nerveis exilissimis, vario nexo inter se complicatis, constet. Altera musculosa seu carne & fibrosa hanc excipit, quæ dupli saltem fibrarum ordine est conflata, quarum exteriores longitudinales, interiores transversæ & circulares a VESALIO, FALLOPIO, AQUAPENDENTE, B. BOHNIO & ORTLOBIO, ab aliis circulares, a STENONE spirales, dicuntur: tertia enim & intermedia fibrarum series obliquarum, quæ acceptum

retineret, quam FALLOPIUS LAURENTIUS & BARTHOLINUS agnoscant, vix conspicitur. Perinde WILLSIUS duplicem musculum compositum, duplexque stratum fibrarum obliquarum sese mutuo decussantium, finxit potius quam revera demonstravit, etiam si pinxit atque delineavit. Seduxit forte hunc eminentem in medicina Virum brutorum anatomia, in quibus utpote prono corpore incidentibus & horizontaliter gula locata, capiteq; in terram defixo deglutiunt, utique tales inveniuntur: in homine vero, cui soli os sublime datum est, cœlumq; in tueri, alias fibrarum ordo omnino habetur. Nec est, de ventriculo dubites: eum haud alia fibrarum serie esse instructum, quod fere appetet, sed revera tantum appetet, & cum rei veritate non convenit. Nam quoniam in ventriculo, Sphæricam figuram referente, non in rectas lineas, ut in gula, excurrere possint, sed hanc sequantur necessariae. Hinc dum ab uno ad alterum orificium feruntur, ascendere, descendere, incurvari eas dices. Idem de circularibus putares, eas ob hanc pariter rationem, modo recta a summitate ad fundum, modo oblique magis flecti. Tertia nervosa vulgo appellatur, sed rectius rursus tendinosa dicitur, quia ex tendinibus carnearum fibrarum, musculosæ tunicæ, componitur. Præ reliquis hæc longior est, & varias plicas, rugas & inæqualitates præminent transversas potissimum, & sinus tam in ventriculo, quam in intestinis impressum tenuibus, format. Intima tubulosa & glandulosa est, & in ventriculo & intestinis crustæ etiam villosæ, & ab HORNIO velamenti bombycini, & spongiosi peristomatis à PECQUETO nomen eidem imponitur. Hæc propter porositatem & tubulosam conformatiōnēm filtri loco se habet, quæ laudabile

Iaudabile tantum fluidum transmittit, crassum vero ac iners
prompte excludit.

§. III.

Harum partium initium faucibus cohæret, sub pharyngis nomine veniens aliquot musculorum paribus, & sphinctere compositum. Ubi victu nos reficimus, hoc ore assumta alimenta solidiora prius bene masticata & comminuta, & salivalis laudabilis humoris tanquam genuini menstrui permitione prius bene præparata suscipit, per easque commissa sibi adactio[n]e, contractione & coarctatione ulterius per gulæ tractum, cum diaphragmate, trachea & dorso connexum excipientibus nimirum longitudinalibus, & constringentibus circularibus fibris illius promovet, quam actionem deglutionis vocant,

§. IV.

Descenso oesophago, perforatoque diaphragmatis inferiore musculo, inter hepar & lienem paululum in sinistrum hypochondrium inclinatus, a tergo, pancreate constituto, & fundo colo intestino substrato, omentoque anno, canalis in amplum spatum amplaque globositatem oblongatam, atque tibiam utricularem fere referentem dilatatus & formatus ventriculum constituit: dextorsum rursus incurvatur in fundum & flexus ac successive angustatus, atq; hinc iterum ascendens in canalem mox arctiorem & longissimum, adeo ut totam ferme abdominis cavitatem repleat, transit, & in varios hinc sinus, gyros, circumvolutiones, anfractus & spiras disponitur & convolvitur, ne alimenta citius justo elabantur & ne vix absoluta chyli elaboratione, si statim elabetur, aliud mox alimentum assumere cogamur &c. animalia hinc quo breviores & rectiores ductus habent a ventriculo ad anum, eo gulosiores sunt, exemplo anatum, lupi cervarii & corvi,

corvi aquatilis, & hominis illius parisiensis, cuius mentionem facit DIONIS *Nouvelle Anatom. de L' Homm'* pag. 170. Orificia duo hic in primis spectantur, in suprema ventriculi regione & qualiter propemodum posita: sinistrum nempe, quo ventriculus superne patet, gulæque subjacet conjunctus, per quod introitus panditur, & dextrum, quod & pylorus, quasi janitor vocatur, & exitum rursus concedit. Hoc sphinctere seu valvula orbiculari est donatum, majori pliea a tendinea tunica formata, ut transitus non redditus remeanti chylo constet, estque plurimis fibris, iisdemque sat validis stipata, ut commode coarctari possit; attamen utrumque clausum in recte valentibus est.

§. V.

In intestinorum orbibus per duplicem membranam mesenterii connexis, & quidem eorum statim initiis duodeno, quod ventriculus quasi succenturiatus est, ductus choledochus & pancreaticus in primis nominandi & in reliquis seorsim attendendæ sunt valvulae conniventes KERKINGIO dictæ & adscriptæ (quamvis ante eum HIER. FABRICIO eas innotuisse constet) quarum potior & major colo, omnium sensibilissimo, quoniam præ aliis ligamento nerveo tendinoso quodam praeditum est, adstructa est BAUHINI vulgo nominata, eique Auctori, sed falso rursus adscribitur, (cum jam VAROLIUS, SAL. ALBERTUS & PICCOLHOMINEUS illam observaverint) & membranosi vel carnosí circuli speciem refert. Reliquæ minores, cellulas hujus intestini (coli) simul efformant, adicto ligamento huic proprio contractas (hinc annotante SPIGELIO hoc resciſſo disparent,) & ex fibris carneis, musculosis motricibus constant, atq; impediunt partim ne chylus juxta lympham regurgitare & regredi posse, partim, ne celerius nimis effluat, atque

atque adjuvant potius, cogendo, ut tunicam villosam subintret facilius. Quæ valvulosa conformatio, quique spiralis hujus texturæ tractus atque actio in lepore in primis, vulpe marino & struthiocamelo &c. investigantibus claret. Speciam dicendum est: cellulas diverticula fæcibus concedere, ut inibi hæreant, donec collectæ mole sua secessum urgeant. In recto tandem adducendi sunt musculi constrictores, seu sphincter, inferius orificium constringens, & levatores bini intestinum iterum a fæcum excretione in suum locum retrahentes.

§. VI.

In iisdem sparsæ sunt disseminatae; vasorum lacteorum anfractuosæ radices, & capillares ramuli, & ex iis obliqu; oriuntur, quarum jam non paucæ primo intestinorum tenuium duodeno emituntur; numerosissimæ vero ex altero jejunio progrediuntur: ileon jam pauciora, paucissima (vid. BARTHOLIN. *Anatomia Lib. I. Cap. X.*) & sæpe nulla colon habet. Quamvis etiam Anatomicorum non desint, qui atq; adeo in recto vidisse asserunt, (inde colligitur clysteres nutrientes interdum aliquid posse.) Hæc chylum per crustam villosam transcolatum, & ab aliis inertibus partibus separatum & secretum, ex intestinis ad mesenterii primum glandulas, primi generis dicti, vehunt, ulterius promovendum. Fæces vero alvinæ, secreto chylo, foras excernuntur. Reliqua vasa, quæ has partes perreptant, tam arteriosa quam venosa, lymphatica, glandulas, nervos a pari vago, plexu mesaraico & intercostalibus ortos, lympham, &c. quæque alias in considerationem veniunt, nominasse hic saltem sufficiat. Ob has causas modo recensitas, connexionem, continuitatem, viciniam, generis & officii societatem, & partium nervorum communionem &c. inter ventriculum & intestina ac non fal-

tem adjacentia atque proximiora viscera, sed & multas alias partes longissime remotas magnus datur consensus, ut iis male se habentibus una simul aliæ afficiantur, & vice versa. Unde v.g. patet, quod ex gravi capitis lœsione, & nephritico dolore & paroxysmo a tufi vehementiori &c. calculorum motu vomitus sâpe oriatur, & quod ventriculo male se habente, vertigo, sensuum stupor, oculorum tenebræ, dolor capitis, epilepsia &c. incurvant & quod in omni fere morbo appetitus & digestio lœdatur &c.

§. VII.

Duplicem naturalem ventriculi & intestinorum notabiliorum potissimum deprehendimus motum, inde sinenter operantem etiam dormientibus nobis. Externus nimirum & communis est alter, alter internus & proprius. Ille a motu in primis pressuque ceu preli diaphragmatis aliquot millenis vicibus singulis horis depresi, reciproco & continuo, quo ventriculus, cui adhaeret, movetur, exagitatur & conquassatur, quoque, dependet. Intestina in specie juxta eum, qui a ventriculo procedit, & adeo simul usque continuatur, motum suum externum tam a mesenterio, quam ab abdominis quinque muscularum in homine paribus contractis in exspiratione, abdominalisque fornicem contrahentibus potissimum mutuantur. Quorum actio adeo necessaria est, ut in animali vivo dissecatis his, atque eorum actione sic impedita, chylus ex ductu thoracico vulneratione aperto, non exit, nisi externa manuum contrectatione sollicitentur iidem.

§. VIII.

Alter, qui præ altero in œconomia chylificationis restorem & moderatorem se præstat, ex interno principio, & propria harum partium substantia profectus hic motus peristalticus est: nostræ præsentis considerationis argumentum.

Primum

Primam hujus mentionem GALENUM injecisse appareat ex Lib. VI. Epidem. Sed. V. p. m. 27. post hunc FALLOPIUS, demum eum (quantum ego quidem sciam) notabiliter satis in observat. anatom. reddidit explicatum. Alii quidem ASELLIO una cum vasorum lacteorum inventione, acceptum referunt, sed utraque dubia adhuc ab aliis quoque redunduntur. vid. TH. JANS. AB ALMELOWEN invent. nov. antiqu. Hujus organum æque sunt fibræ motrices, justotono gaudentes, i. e. quæ nimis rigidæ sunt & duræ, neque nimis laxæ & molles tunicæ musculosæ, præcipue circulares, per totum ductum excurrentes, spirituum animalium influxu turgidæ, & animata, per octavum nervorum par, geminis ramis, surculis insignibus, & plexibus, in primis circa orificium ventriculi sinistrum conspicuis, & intercostales sufficienter concitato, instigante simul tunica nervea substrata, a ventriculi & intestinalium contentis vario modo affecta, & affluente per arterias sanguine calido atque spirituoso. Horum enim affluxus, ut agant fibræ motrices, per quam necessarius est, ut ab hoc convenienti in tota œconomia animali omne omnium partium robur, omnistonus & motus visque agens & constringens potissimum immediate & proxime procedit. Hæc corpora subtilissima & agilissima primum impetum faciunt, primumque afferunt motum a fibris motricibus peragendum. Atque is exerit sese dilatationis & constrictionis successivo motu, & vermis aut lumbrici instar terrestris repentis, limacis aut hirudinis a superioribus ad inferiores partes sensim sensimque moyetur. Quemadmodum enim ejusmodi reptilia animalia his sui corporis partibus corpori subiecto adhaerent, aliis, deinceps contrahunt antrosum versus, ut præterlabantur corpus cui innituntur, ita simili modo motus peristalticus procedit. Incipit jam, ubi incipit totus canalis, œsophago, quo assumpta

per deglutitionem in ventriculum, & ex hoc ad intestina protruduntur, in quibus etiam præ aliis, in ileo manifesto magis indicio se prodit ac urget, & contenta ibi ulterius promovet, secernenda secernit, excernenda vero excernit &c.

§. IX.

Nimirum (ut explicatius de eo, quod res ipsa postulat, agamus) indesinenter, successive & per subsultus velut lente & pedetentim per partes & series articulosq; quasi intestinalium repit atque progreditur seu reciprocus, interpolatus (interjecta intercapedine remissione & pausa) atque undulatorius est, per undas quasi fluctuantes & flexuosos gyros & quilibi semper ordine per universam canalis longitudinem se volvens atque provolvens. Quippe fibrarum contractiones ob intestinalium longitudinem & anfractuosum serpentinumq; ductum cavernarum cellularumque hinc inde remoram non tantæ sunt, ut contenta una continuata simul propulsione ab una extremitate ad alteram ejicere possint. Hac enim parte intestinali contracta, colligentibus prius ingestum fibris longitudinalibus, angustataq; contractis maxime circularibus, & insecura immediate eodem tempore longitudinalium proxime subjacentium prius ab ipsis dilatarum corrugatione & abbreviatione intumefactioneque pars una intestinali ad alteram, unum latus ejusdem ad alterum proprius adducitur, & contentum, quod fibras modo pressit & dilatavit, a fibris rursum contractis in alteram vicinam inferiorem vacuam, & magis ampliorem, dum a constrictione feriatur, adhuc propellitur commode, quo propulso recepto, infarcitur & dilatatur magis, donec cessante hac dilatatione, iterum novo impetu per varia eademque instrumenta, fibras, valvulas &c. facto, a tergo semper inequente & premente similiter constringitur, qui reciprocus dilatationis & constrictions motus per vices iteratur, donec

donec cuneo quasi cuneum trudente, unde accepit, aliis redididerit illud. Atque ejusmodi interpolatus & latus motus de rei necessitate utique est, alioquin chyli distributio haud rite institueretur, & chylus cum facibus mox proflueret. Parum absimilis hic motus peristalticus ventriculi & intestinorum est illi, qui fit in aliis quoque canalibus & partibus, corde, arteriis, tubulis secretoriis, & excretoriis, venis, vasis biliaris urinariis, utero, in partu præsertim &c. qui pariter in his ad sanguinis & humorum præparationem, elaborationem, progressum & distributionem perpetuandam, & contentum provolvendum aq; per dilatationes ac constrictiones invicem contiguæ excipientes sic movetur & movet &c. Præter hanc prævolutionem, quam instituit motus peristalticus, a superioribus nempe ad inferiora J. C. PEYERUS *de glandulis intest. cap. 4.* aliam & in intestinis quidem saltem tenuibus (in crassis enim contenta spissiora fluctuando non sunt) similem fibrarum contractionem, inverso modo a parte inferiori superiorem versus inchoatam, secundum naturam, adeoque variis motibus reciprocis motum peristalticum ferri probat, cum HELMONTIO.

Vid. lib. de flatibus. pag. 271. n. 37. in puerο illo hernioso atque WEPFERUS experientia in muliere quadam, & brutis diversi generis dissectis, stabilivit. Ab his FRANC. GLISSONIUS non alienus est *de facult. mot. perist. p. 288.* unde hunc motum peristalticum luctantem vocat, a fluctuante inæuali, quem sibi concipit quoque diversum, in quo (fluctuante) fibræ superiores & inferiores inter se certarent, antagonistarum ad instar, & materiam contentam modo huc, modo illuc propellerent, quem prodromum naufragi, eructationis, vomitus, præmaturi descensus chyli, terminum intestinorum, doloris colici, fluoris alvi, & similiū symptomatum habet, in dyspepsia & flatibus præcipue conspicuum.

B 3

Etenim

Etenim sub tali quadantenus fluctuatione, cui præcipue cœcum Intestinum conformatio[n]e sua famulatur, qua volvitur ac revolvitur, chylus in ventriculo & intestinis, ultro citroque per breve licet intestinorum dilatatum spatiu[m] (ut mihi concipio alias ob contrarium motum peristalticum a superiori ad inferius in eodem canali non adeo hic esset expeditus) constanti serie, blanda contractione & propulsione, agitatio, conquassatio, hinc inde commixtio, comminutio, solutio, discontinuatio, secretio utilis ab inutili melius & expeditius succedunt, nec mora contentorum, quam ibi nequant, otiose & inutiliter instituitur, quam etiam vix intestina vivo motu gaudentia patarentur. Alterum vero fluctuantem etiam non equidem negandum, sed ad statum potius præternaturalem referendum, esse quilibet facile sentit. Intolerabilis autem plane in PROSP. MARTINO est error, qui *in comment. in Hip. f. 119.* a ventriculo nihil expelli statuit, ac omnem ventriculi motum promoventem & expellentem præternaturalem habet, a rei molestæ irritatione inductum.

§. X.

Magnum & mirum est, quam validus fortisque sit. Haud vilis enim vis requiritur, quæ pars sit, ventriculi fundum & latera sursum ducendo, ejus cavitatem plurimum arctando, contenta per adeo longas & tortuosas Intestinorum ambages, per cœci intest. secessum & latibulum &c. propellendo, secernenda excernendaque expediendo, quæ mole & qualitate non raro molesta premunt, atque nisi huic & nisu contrario a reactione resistunt. Nam si ventriculi & intestinoru[m] amplæ cavitates adeo notabiliter non constringerentur, ut pars una ventriculi & intestinorum ad alteram accederent, rugæ & plicæ inter se alliderentur, partes alimentorum & chyli vix possent ita arteri, dividi, & solvi. Ventriculus enim cibos omnino arctius comple-

cti

cti debet, quo melior fiat digestio & purior, alias angustos tunicarum poros non facile possent ingredi nutritiæ partes, neq;
excernendæ excerni. Hanc vim, hoc robur, hancque potentiam pro cuiusvis judicio tradimus ulterius expendendam, quod post absolutam chylificationem ventriculi cavitatem sat amplam aliquot mensuras circiter capientem adeo contrahat, ut vix pugnam capiat, & quod in curatione obstruktionis alvi pertinacioris & passionis iliacæ, magna mercurii vivi, metallorum omnium gravissimi, quantitas ad aliquot quandoque libras ore assumta, conf. PANAROLUS *Pentecost. I. observat. ultim.* aut ex consilio aliorum (an æque bono consilio dubium) globulorum plumbeorum minorum aut majorum haud parvus etiam numerus (quo major is esset, eo tutiorem & celeriorem promittit sanationem. HELLMONT. *Lib. de flatib. §. 11.*) per singulos intestinorum gyros & sinuosos anfractus sursum deorsumque etiamsi resistente vi morbi ad exclusionem ab hoc ipso urgeantur. Huc referenda est historia a WEPFERO recensita in epist. ad Peyer. de vulnerato quodam in regione gastrica, qui ultra passus distantiam liquorem chyli formem aliquamdiu post assumta alimenta projectit. Magnum mirumque magis adhuc est, quam validus sit, si præter naturam irritatur & pervertitur, adeo ut omnium repagula, omnesque obices eos etiam fortes, valvulas, pylorus, sphincteres effringat, quæ violentia in primis in passione iliaca conspiciuntur, in qua horrendum & miserandum in modum excrementa ex intestinis extremis, magna vi per os supremum ejicit, adeo ut observationes Auctorum : GALENI, PRIMIROSII, PEYERI, THONERI, DIEMERBROCKII, BLANKARDI, aliorumque constent: suppositoria, glandes & clystres immisso per os totos fuisse ejectos. Ex his MATTH. DE GRADIBUS de puella passione iliaca affecta, stupenda re- censet:

censet: quod nimirum suppositorium quatuor tandem filis fortioribus ad coxam alligatum & immissum ano, disruptis his multiplicatis filis a morbi violentia raptum atque excretum fuerit.

§. XI.

Utut validus fortisque est, admodum tamen subtili, moderato, molli, miti, placido atque leni modo non sentientibus nobis instituitur, cumque adeo subtilem esse, ut non verbis satis exprimi queat. F. GLISSON. I. a. dicit. Atque vix utique forinsecus cadit sub sensus: visum & tactum, adeo ut hinc non desint, qui cum potius in dubium vocant, atque plures eapropter obscurum appellant, inter quos PECQVETVS eminet, qui eum nuspiciam deprehendere potuisse affirmat, atque ideo hepati illius munus potius demandare voluit. Equidem in animalibus vivis minoribus nimirum dissectis, canibus, &c. ut & motus alioquin aliorum muscularum conspectus obscurus est, ægre inquam ab extra apparet, at in grandioribus bobus nempe & equis in sensus manifeste statim eum incurrere alii dicunt, quanquam etiam alii in felibus & cuniculis satis cum perspicuum esse, perhibent, atque adeo in vulneratis hominibus aliquando observarunt, RIOLAN. in *Opusc. Anatom. novo c. PECQVETO p. 161.* V. G. H. WELSCH. *Observat. decad. VII. centur. V. p. 416.* & HELLMONT. lib. de flatib. §. 38. (qui in puero hernioso eum vidit) Insuper eum & vidisse HARVÆUM lib. de generat. animal. & DOLÆUM sapissime in vivis canibus dissectis legitur *Encyclopæd. med. dogmat. lib. II. cap. VI. p. 499.* atque adeo in pediculo oculis arinatis observari eum HARTSCHOEPER. in *contin. conject. phys.* notat. In recens mortui animalis extemplo dissecto ventriculo, atque in frustis intestinalium dissectis interius ad temporis notabile quoddam spatium, multiformem & sat formem

tem ejusmodi constrictionis & dilatationis motum cumuli ad instar nitentium vermium implicatorum, varie intorquentium & motitantium me non semel vidisse memini. Ut lenis sit & placidus utique rursus necessarium est, nimirum ut alimenta coquenda, digerenda, solvenda, fermentanda, colliquecenda sensim, extrahenda & in perfectum chylum & in commodum alimentum convertenda, lento gradu conficiant iter, & debitam quasi nestant in canali moram, quæ ad illius perfectionem requiritur, & ubiubi laudabile alimentum insit adhuc, evolvatur, & ne citius justo præcipitique cursu præterlabantur & indebitè ejificantur eadem. Hinc experimur, in alvi fluxionibus, si excrementa spissiora fiunt: viam spemque adesse ad salutem recuperandam, quod redeuntis coctionis signum vocant: indicans, motum ventriculi & intestinalium hucusq; acceleratum nimis, simul ad meliorem frugem redire, atque secundum naturam iterum institui, i. e. blande & lente ferri. Accedit &, quod sub leni, placidoque, reciproco, circumpressorio, dilatatorioque motu, debitæ, tenuiores subtilioresq; saltem succi alimentaris partes, per tunicam villosam transcolectantur, & per poros ejus ad vasa lactea adigantur, & ab inertibus secernantur felicius, si enim vehementior esset, crudæ crassæque inutiles nocivæque simul transjicerentur, & chylus impurus evaderet. Nam sub placido & lentiori motu omnes ubique secretiones & excretiones melius quam celerrimo & concitatori peraguntur, atque partes fluidæ a crassioribus longe facilius separantur. Id quod vel domestico experimento satis notum est atque perspectum: Si enim aliquis liquorem subtilibus & crassioribus corpusculis infectum, vel massam liquidorem perfusam per linteum patinum, transcolare velit, & ministerio digitorum, paulo fortiori compressione, contentum exprimat, crassum, fæculentum & turbidum humorem

morem, loco tenuioris & limpidoris liquoris accipiet. Hinc etiam patet, cur bene valentibus alvus lenta & fæces spisiores & paucæ sint.

§. XII.

Insuper facillimus est, & ex una in aliam partem, ex ventriculo ad intestina, & ex hujus generis in alterius intestinorum, & celeri sæpius motu vagatur in hac vel illa eorum parte stimulatus universum canalem continuum facile pertransit, adeo ut mirum sit, quod per reciprocas suas constrictiones & dilatationes, & per undas fluctuantes tam cito ferri poscit. Hoc clarissime in purgantibus patet, quæ in una saltem intestinorum parte quandoque hærent & stimulant, cito tamen purgationem in universum instituunt. Fortius & celerius adhuc agunt acres biliosi humores in una modo parte confluentes, quod in diarrhœis & dysenteriis accidit. Fortissime se exerunt venena & summe corrosiva causticaque assumta, quæ citissime & mox sæpius ab assumptione per superiora & inferiora simul irritationem & secessum moluntur. Quid? quod alvi dejectionem & vomitum saltem visa v. g. Purgantia, vel solum cogitationes & reminiscencia de nauseosis purgantibus excitant. Pariter & notum satis est: animi affectus varios præ aliis, uti in tota œconomia animali, ita etiam in hunc motum peristalticum magnum habere imperium, magnamque potentiam, eamque per fluidum, spirituosum, subtilissimum illud, in hunc hasque partes magnopere exerere, adeoque & magnam vim poscidere, hunc intendendi, immutandi & destruendi atque in quibusdam facile solvendi alvum &c. Huc pertinet, quod observationes ferunt Auctorum: a certo sono audito statim quosdam reddidisse alvum &c. a nonnullis rursus fuit observatum, vel ex leviori ventriculi compressione non saltem chylum, sed & semicruda cibo-

ciborum frusta per intestina transfluxisse. Facile etiam adfvescit, vario modo, ut in his mox retardetur, in aliis acceleretur & homines semel aut bis in die, aut alternis diebus, aut bis tantum in septimana &c. secedant. Eiusmodi etiam est quod natura, ut adjunt & habent, facile clysteribus adfvescat, ut nonnisi alvus sic admonita officium suum sequatur. Itaq; cum in omni re optimum sit, optimis adfvescere, motus peristalticus Intestinorum ut quotidie alvum egerat utique commendandum est. Amplius possemus commemorare, motum hunc peristalticum non modo hoc intuitu haud esse difficilem, sed & si consuetudo accedat, quæ altera est natura, etiam ad alia alvi atque adeo quæ ad statum magis alias præternaturalem spectant, posse reduci, ut visi sunt, qui pro lubitu quovis tempore sponte vomitum ediderunt, quod etiam non adeo rarum helluonibus est, quibus ad nutum semper ventriculus contrahitur, & infarcta reddit: BARTHOLINUS vidit Melitensem bibonem omnes liquores assumtos pro nutu rejicientem. Ut in quibusdam animalibus brutis, lupis &c. simile etiam habetur, quæ vim ventriculi expultricem per superiora, (ut agunt) animalem & naturalem obtinuisse videntur. G. MOEBIUS in *Fundament. Physiolog. refert.* vidisse canem anglicam majorem, quæ singulis diebus aliquoties cibum, quem devorasset, suis catulis nutrimenti loco evomebat.

§. XIII.

Subit inde animus, quod res obtulit, quoque ulterius explorandi, unde impulsus ad hunc validum fortemque motum instituendum & continuandum, perque tam longum intestinorum volumen quinques, sexies, imo interdum pluries justæ hominis staturæ longitudinem æquans, per tot circuitus, & anfractus etiam sursum ascendentes, agens, proveniat, quodque gubernet hoc longum intestinorum iter. Ad hoc

C 2

defini-

definiendum, luſtrandum ſiſto: omnem in universa œconomia animali (ut & alibi) humorum progressum, & impulſum fieri per principium quoddam, magno movendi robore inſtructum, qualia v. g. ſphincteres ſunt. Tale igitur hic quoque deſiderari, neque id ſimplex, ſed multiplex & varium pro rei exigentia, argumentatio valet. Quoniam motus ſemper a motore recedens ſenſim ſenſimque magis fatigat, & canalis alimentorum tractus tantus & longus eſt. Atque in his partibus, docente anatoma, & ſuperius in conſpectum datis, jam ad eſſe non unum ejusmodi movendi, principium, idque ſatis validum atque idoneum, ad hunc motum inſtituendum continuandumque, colligitur. Nam in initio canalis, pharynge, ſphincter ſtatim locatus primum agit motorem, qui forti-ori facta conſtrictione, ore aſſumta per rectam brevemque viam, giam protrudit, ubi ingeſta per os ſinistrum, & per tempus aliquod ibi retenta, novo impellente ulterius promovenda habent neceſſe, quo offiſio dextrum ventriculi os, pylorus, robore ſat valido inſtructus, fungitur, qui contenta, ad intestinorum usque tenuium exitum perveniendi, impellit, ubi excepta circa coli intestini initium, valvulosa, & membranacea nerveo muſculosa, ac fibroſa, & ligamenti nerveo tendinosa, quo gaudet praे aliis, conſtrictione valde robusta, juxta valvulas cooperantes, quæ in hoc itinere offenduntur, ad finem recti intestini, usque ſphincterem pelluntur.

§. XIV.

Juvamini & ſtimulo commode huic motui peristaltico, plurima ſunt, quæ ſubveniunt, nempe & primo quidem inſpiratio & exſpiratio ſuccelliva, & qui ab illa procedit, ventriculi & intestinorum motus, qui partim a diaphragmatis reciprocō motu, deorsum dēcendente viſceraque in abdomen contenta, leniter & continuo comprimente, & blande con- citante,

citante, ut sensim dimittant, dependet partim a mesenteri, quo sunt affixa & muscularum abdominis quinque paribus actione oritur, qui diversis fibris obliquis descendantibus, ascendentibus, rectis, in pyramidem cuspidatis, transversis instructi sunt, & ad varios motus edendos eapropter idonei. Juxta horum motum quoque reliquorum adjacentium viscerum, hepatis lienis, &c. famulatur. Multum adhuc hunc promovet ipsius aeris irruentis & cum alimentis subeuntis, elater, quo & ventriculus & intestina blande inflantur, cum flatulentiae illius modicæ, & mitis, placidæ & amicæ turgescientiaque, in intestinis, jejuno in primis & ileo s. N. adest, iisque illorumque tunicis vigorem quandam roburque afflat, eaque vacua servat expansa, sine qua expansione flaccida conciderent latera, & motus & excretiones non forent expeditæ. conf. HELLMONT. lib. de flat. Hinc patet, cur intestinorum angustia quandoque accusetur. Nec non ei calcar quoddam bilis influens addit, quæ particulis suis salinis fibras movet motrices, easque ad motum peristalticum instituendum, de novo invitat & sollicitat. Hinc, si hujus affluxus impeditur, quod in ictero accidit, alvus redditur constipata, confer. KERKRING. spicileg, anatom. p. 82. & si abundant & si corruptæ sint & acriores, citata nimis est alvus. At huic confert non modo salinarum biliosarum particularum stimulus, sed & illarum juxta pancreatici succi elasticitas, quæ sequenti experimento probatur: secuto canis vivi abdome, in duodeno fiant filo ligaturæ duæ, una infra pylorum, altera insertionem ductus cholodochi & pancreatici, consuto abdome, & elapsis aliquot horis, denuo aperiatur ligata hæc duodeni pars, tumidam valde & ad rupturam, usque tantum non conspicies. Ubi aperies vulneratione tumorem, usque adeo inflatum, ut flatus & bullulæ spumantes cum sonitu quin strepitu exeant deprehendes & narcs

acri exhalatione stimulatos senties. confer, MART. LISTER,
Dissert. de humor. p. 152. nec plane otiosæ hic sunt partes bilis
unctuosæ, quæ insunt, sed potius lævigant latera intestinorum,
ut facilius descendant per motum peristalticum mota conten-
ta, & illorum fluiditas augeatur, ut pictores suos colores te-
nuiores reddunt & fluidiores additis bilis aliquot guttulis.
Concurrunt porro valvulae conniventes, & semilunares in te-
nuibus numerosissimæ, quarum per fibras suas itidem maxi-
me transversales carnosæ tunicæ continuas constrictio & dila-
tatio ab una ad alteram successive instituitur. Adjuvare etiam
eum possunt simili modo esculenta & potulenta fermentesci-
bilia, cum ipsa dein solutione, quam vocant fermentationem,
quæque revera non multum absimilis est ab alimentorum in
ventriculo celebrata turgescientia, exinde enata, ut argumento
sunt præter hanc ipsam inflationem ructibus flatibusque te-
stantibus, intima quæ hic celebratur corporum dissolutio, & ace-
scentia relicta &c. Non longius hic adducam salsa, aroma-
tica, &c. quæ cum cibis ingeruntur, ventriculum statim ad
motum peristalticum instituendum, vellicazione, una cum
menstrui ventriculi particulis energeticis, salinis, & calore in-
fluente, a motu sanguinis intra vasa ventriculi, & intestino-
rum, ut & partium circumiacentium, hepatis lienis &c. agi-
tatione pressi, stimulare. Cæterum facilitant quoque hunc
motum notabiliter irrigui intestinalium & tubolorum crustæ villosæ, quam
continuo stillant, humiditate lubricati atque perfusi. Ut ex-
perimus vel clystères saltem emollientes & lubricantes sua
fluiditate alvum proritare. Nec etiam de nihilo est ipsa
contenta in primis spisiora facta fæces & quantitate & quali-
tate atque calore hunc exclusionis motum sollicitare. Per se
quoque jam constat: hunc motum sub motione corporis vi-
gere magis, at esse in dormientibus & quiescentibus lento-
rem

rem &c. Ex præternaturalium magis causarum ordine, quædam etiam sunt quæ si non admodum irregulares & violentæ ad-jutorio & excitatorio interdum, salutari motui peristaltico, singultus exemplo, esse possunt, ut alia minoris forte momenti jam taceamus.

§. XV.

Proinde motus peristalticus præstantissimas actiones, & usus utilissimos habet, atque multa, varia, egregia, atque insignia corpori præstat emolumenta, alia aliis potiora. Primo non absonum est, eum primum, in chylificationis œconomia, motum, in ventriculo, & maxime orificio superiori, sensibili admodum, appetitum salivamque movere, ac excitare, fibras contrahendo motrices, nerveæ etiam tunicæ atque maxime ac simul eo, salinas partes vellicantes in actum ducendo, quo superiori orificio molestia infertur, & desiderium cibi spiritibus imprimitur animalibus &c. Hinc in esurientibus stomachus valde in asperitates contrahitur, contrahentibus se perpetuo fibris, usque dum materia quædam adveniat quæ illas dilatet, quam constrictionem quadantenus infringendam, famemque fallendam ERASISTRATUS notat: Scythas jejunare necesse habentes, ventrem latis fasciis constringere. Integro illo, appetitus integer est, labefactato hoc, labefatur ille, ideo etiam sub aeris statu austriño, fibris motricibus ventriculi laxatis, sensatio hæc minuitur, atque omnia alia, quæ tonum ventriculi laxant appetitum quoque langvidum reddunt, at augetur frigido eo, elasticò, magisque fibras robante &c. Assumta deinceps ex œsophago ad ventriculum, & ex hoc ad intestina, & per ea, promovet non solum, sed & dum per plicas ea agitat, & partem tunicæ intestinalis pli- cat & replicat, adeo ut reciprocam fluctuationem, per series intestinorum reciproce compressas & dilatatas, experiantur,

ac

ac una eademque pars chyli, modo deorsum modo sursum,
& ad omnia latera prematur atque conjiciatur, & fricitur inter
se invicem, atterit ea comminuit dividit, discontinuat, sol-
venda, subigenda, attenuanda, digerenda, int̄imius solidā & siccā
cum liquidis & humidis, cum menstruo ventriculi, aliisq; acces-
soriis miscenda, irroranda & diluenda, cogenda atque con-
fundenda ac ut illud per contractiones suas reciprocas, ex glan-
dulis quasi emulgatur, auxiliatrices quasi manus porrigit. Sub-
actum jam & elaboratum chylum distribuit æqualiter, ut non
uno in loco, cumulatim congeratur, in alio, haud in medio-
cre chylificatorii negotii incommodum deficiat, quo per
totum chyli iter, is operatur haud secus atque ii, qui farci-
mina infarciunt, ubi contrectando sensim intestina infarcta,
materiam inditam ita disperciunt, ut nullibi inæqualis hæreat
infarctus. Atque eum agitat & quassat, eoque ut facilius vasa
subeat, præparat, ut v. g. videmus: aquam saponatam, attri-
tione manuum, per linterminum poros facilius transire, eo-
que opportune iis admovet eum, ut particulæ ejus poris ex-
cipientibus obviam fiant, atque filtrat, colat, exprimit, traji-
cit per tunicae villosæ insensiles poros, & minutissimos tubu-
los cavae, vario modo sibi intertextos, (ut optime descriptit
BRUNNERUS *de gland. intest.*) quæ in vasa lactea abeunt.
Unde molliori & liquidiori & puriori materia secedente, soli-
diora in intestinis crassis redduntur, ut fæculentia sic paulo
crassior remaneat omnis. Sicque ut secretio utilis ab inutili,
quod utrumque commixtum ex ventriculo venit, sive chyli,
qui omnium humorum laudabilem & etiam minus lauda-
bilem, materia prima existit, a fæcibus, & processus ad vasa
lactea, & per ea ulterius fiat, opitulatur. Siquidem & certe
pellit ipse motus, vibratione sua, peristalticus intestinorum
chylum, per vasa lactea ulterius, ab iis exceptum, adjuvantि-
bus tamen aliis, ut valvulosa ipsorum lacteorum conformati-
one

one & structura ejus accuratam descriptionem RUY-
SCHIUS tradidit) & diaphragmatis abdominisque
musculis, ad mesenterii glandulas, ubi motus, quem ab illo ac-
ceperunt, & hic novo impetu addito, ulterius continuatur.
Difficultas quidem circa chyli vasa lactea ingressum quædam se
objicit, quæque multorum ac egregiorum Virorum, ut PEC-
QVETI & LOWERI, mentem dubiam torsit, quod nimirum
sub hac motus peristaltici contractione, venarum lactearum
orificia claudantur, adeoque via, venienti chylo, intercipiatur;
sed expedita res est; a systole quidem chylum, ad partes urge-
ri, sub diastole vero illum in sua vasa & patula, adjvantibus
musculis abdominis, ut bene, modo laudatus PECQVETUS
monet, jam intrare. Hæc agendo alio tempore corpori quo-
que consulit, quando simul operatur, ut medicamenta assum-
ta, vim suam medicatam, decenter & tempestive, omni-
bus partibus impertiantur. Atque tandem quoniam excreti-
ones partium inutilium, superfluarum & noxiarum æque ne-
cessariæ sunt, ad nutritionem, sanitatem & vitam ac congru-
orum alimentorum ingestiones, statim quoque appareat, quod
ad illorum exclusionem, motus intestinorum peristalticus æ-
que necessarius sit, quæ ab ejus conditione dependet: Quo ro-
bustior & vegetior hic est, eo citius fæcum exclusio, quod pro
sanitate est, expeditur; ut in hoc observatur varia hominum
constitutio & differentia: Quo lenis, langvidus magis, & pla-
cidus est, ut in iis, quibus omnes reliqui motus sunt segniores,
quos Phlegmaticos, pituitosos vocant & melancholicos, ubi
impeditus est, ut in hypochondriacis, & hystericis fœminis,
eo lentius etiam & impeditius, hic quoque procedit: Quo
fortiores & citatores vero iidem, quos ii experiuntur, quos
cholericos nominares, eo etiam liberius & expeditius agit.
Secundum hæc, primaria fere alia adhuc sunt haud minus ta-
men proficia, quæ ab illo procedunt. Hic mox v.g. recen-
senda est bilis & succi pancreatici in intestinum duodenum ef-

fusio, quam ex his ductibus exprimit, & simul ipsum fellis folliculum, in consensum trahit. Sic etiam facit quoque ad flatulentiam naturalem: Nam quivis fere liquor, sive calidus, sive frigidus, in recipiente ad medietatem usque repleto, fortiter agitatus bullas emittit, & remoto obturamento, aliquid flatus exspirat, vel ut is etiam in liberiori aere, virgula frequenter percussus dat bullulas flatibus plenas. Ab undarum in fluminibus agitatione levis semper ventus efficitur & præpetitæ, bullas spumamque colligunt. Pariter confert ad impetuosiorum & molestiam creantium flatuum qui retinentur exclusionem, qui ad excernenda pertinent quoque; Quoniam etiam hi potissimum in colo resident, ligamento nerveo tendinofo ad expulsionem horum hoc magis animatur, unde carminativa & nervina, salia volatilia oleosa, & quæ tonum intestinalorum restituunt, & motum peristalticum armant, ad flatus discutiendos multum contribuunt. Deinde postea quoque experiuntur Medentes, in morbis variis, inter quos hydrops primo omnium nominandus est; naturam stimulatam stimulantemque hunc etiam motum, humores peccantes cum euphoria non modo ex arteriis & vasis satis notis, sed & ignotis adhuc, quæ in mortuis evanescunt, educere & ad intestina promovere, & per alcum cum morbi solutione excernere; cum intestina non modo ad exportandas alvi fæces, sed & totius corporis excernendas, superfluis & inutilibus sit destinata, unde & saepius vel insensibili forte transpiratione impedita, humores superflui in massa sanguinea, turgescunt, & ad ipsa intestina transferuntur, quando v. g. fluxi alvi critici superveniunt, morbos aut præcauentes aut solventes, minime compescendi, qui per motum peristalticum instituuntur & promoventur.

§. XVI.

His commemoratis, fit palam: in motu ventriculi, & intestinalorum peristaltico, esse integratæ, sanitatis, & vitæ protrahendæ causas quærendas. In hoc verum robur ventriculi & intestinalorum consistit, hoc fane recte se habente, tota œconomia animalis stat inconcussa. Tantum quippe ex ejus integritate commodum, ad universum corpus redundat, ut pro hujus conditione, & statu, seu prospero, seu adverso, omnium

um

um omnino partium & actionum integritas, & origo dependat, quæ per eum, & per succum nutritum, quem concepit atque transmittit, nutriuntur, vivunt, florentque. Chylificationem enim, quam hic promovet, & moderatur, præcipue, (quanquam non deveniamus eo, ut cum HARVÆO, PEYE-RO, PITKARNIO, LEEWENHOEKIO, qui prope in ERA-SISTRATIS & ASCLEPIADIS sententiam abierunt, totum chylificationis negotium absolvendum ipsi uni & soli adscribamus.) reliquæ actiones in corpore seqvuntur omnes: Nam qualis est chylus, talis est sanguis, & qualis sanguis, & humores, tales spiritus, & quales hi, tales etiam sunt: nutritio, motus, sensus, vita & sanitas. Atque eo modo se habet chylification, ut si semel vitiata, hæc vitia non facile corrigantur, & quicquid non corrigitur, in prima coctione, non facile corrigitur in secunda, & tertia. Eapropter etiam ventriculus & intestina, & in illis motus peristalticus præcipue in omni morbo, semper sunt spectanda & consulenda. Hinc non inepte ventrem, facultatis naturalis fontem, constituit MESUES Cap. III. Theor. II. Hoc convenienter & HIPPOCRATES indicavit: quando ventriculum totius corporis Regem appellavit, & quando Sect. III. Lib. VI. Epidem. dicit: *ventris segnities omnium confusio, vasorumque impuritas.* Unde etiam canon medicorum nascitur: *fundamentum vitae in sanguine, sanitatis in stomacho consistit.* rursus hoc hic tritum in medicina valet: *qui bene ingerit, bene digerit & bene egerit, sanus est.* Atque experimur quotidie: læso hoc negotio, totius corporis robur dissolvi, atque motu peristaltico labefactato, (quod vitium inter alios misere, paralytici maxime luunt) appetitum perdi, digestionis vim, & facultatem secernendi inutilia, eaque per alcum excernendi, minorem evadere, unde vel paucum vel nullum debitum nutrimentum transmittitur & multarum fordinum in prima regione accumulatio, quæ multis morbis fontem præbet, exsurgit.

§. XVII.

Si itaque ad tuendam valetudinem, & morbos avertendos, præcavendosque, motus ventriculi & intestinalium peristalticus, adeo salutaris, optandum cuivis est, ut bene semper

per se habeat, atq; eapropter, evitanda omnia, quæ eum depravare ullo modo possint, sed potius omni studio servandus est salvus atq; integer, magnum hoc salutis nostræ præsidium, & exitii quoq; certissimus auctor. Depravatur autem, dum aut nimis intenditur, aut penitus invertitur, aut nimis debilitatur, relaxatur, impeditur. Irritant nimis, & eum intendunt, convellunt atque invertunt nimis acria, erodentia, cauſtica, maligna venenata, sive ex tumultuantibus, fanguine & humoribus acrioribus, biliosis, scorbuticis, concepta & eo ab legata, sive intus assumptis congesta, atque concitato hinc in quodam intestinorum tractu, spirituum animalium fluxu irregulare & violento nimis, & provocato sic fibrarum spasmo, adeo ut irritata non possint bene deorsum versus inoveri atque movere, accedente insuper impedimento, motum ordinarium inhibente, & continuata modo irritatione, aliter vix fieri potest, quin contenta sursum per totum intestinorum tractum continuum versus ferantur. Ejusmodi esse possunt etiam remedia alioquin adhibita, at præpostere: vomitoria, purgantia draſtica, resinosa, ut: Scammon. Gialapp &c. quæ diutius ventriculi & intestinorum plicis adhærent, & partes elasticas, molles, & membranaceas sensiles continuo vellicant, & erodunt, torminibus exinde obortis, hyperchatharsi, animi deliquio, alvi obstructione per plures dies insequente, aliisque molestis symptomatibus testibus. Sic ejusmodi primum, nimiam fibrarum crispaturam prompte excitant, ex qua denuo extensus nimis, & tonus relaxatus & perditus insequitur, rarius & difficilius in integrum restituendus. Vix satis enim dici potest, quantum nocumentum huic afferant hæc imprudenter adhibita, a quibus sibi quisque caveat sedulo. Temerarium itaq; facinus est nunquam permittendum ubi vulgus, pharmacoplæ, emperici inscii, & audaces promiscuum eorum usum adhibent; Hinc laude sua, non caret lex, publice Venetiis lata, per quam non licuit cuiquam juniorum Medicorum, purgantia sciammoniata & similia præscribere, proposita publica tabula, ut omnibus esset cognoscendi potestas, in qua nomina illorum Medicorum erant consignata, quibus tantum liberum

berum, ejusmod purgantia ordinandi. Ad hanc perniciem, affectus animi violenti, ut vehemens ira, quæ furor brevis est, occasionem præbent, qui itidem spasmatica contractione agunt. Ex rebus præternaturalibus hic accusandæ sunt, spasmodicæ & conculsivæ affectiones: colica passio, tenesmus, inflationes acres, moleste vexantes & sæpius singultus graves aliosve convulsivos motus ac dolores ægre ferendos, concitantes, vermes & lumbrici intestinales, alvi obstructio, fæces induratae, compressio, hernia intestini recti prolapsus, humores biliosi, acidi, corrupti, acres, tumores, inflammationes, continuæ solutiones, exulcerationes, sphacelus. Ex hac irritatione & constrictione, varii casus, variaque pericula proveniunt, ventriculi & intestinorum corrugatio, angustia, ex qua eorum debilitas perpetua manet: vid. FOREST. Lib. 18. observ. 35. convulsiones, inflammationes, imo sphacelosæ corruptiones atque diarrhoea, dysenteria sæpissime, in quibus exagitatur & acceleratur nimis, rapidior & impetuosior redditur, & hinc copiosas simul, frequentesque dejectiones facit, secundum e- quidem in his suum consuetum ordinem suamque consuetam viam, i.e. a ventriculo ad intestina & exinde, Oeconomiam animalis chylificationis notabiliter lædit & periculose imo periculissime afficit. Major autem ataxia, majorque impetus est, ma- jusque periculum, si contra consuetum ordinem, contraque ordinatam viam, tanquam equus effrenis fertur, quin invertitur & pervertitur, ut in vomitu, in quo impetuosus, violentus & vehemens admodum est, in cholERICA passione vehe- mentior irritatus, atque iratus est, ubi perplexa quasi sedicio- ne, tumultuatur atque indomita undique versum, sursum, deorsumque mobili impetu ruit & furioso; Vehementissi- mus vero conspicitur in iliaca passione, ubi ad extremam per- niciem res spectat, ut plurimum omnis & extremis intestinis, obsoœna contenta, per superius gutturi, cum violentia eji- ciuntur.

§. XVIII.

Præpediunt e contrario cum, deprimunt, inhibent, debili- litant & relaxant, relaxatis nimis fibris motricibus, omnia, quæ dejiciunt vires, narcotica, opiate, exsiccantia, nimium re- frigerantia, styptica, in primis in prima mensa & jejuno ven-

triculo assunta, diuretica nimia, quæ humidum necessarium per urinam evehunt, item crapulæ frequentes, nimiæ cibi potusque vini in primis adusti ingestiones. & ingluvies, a quibus nimis distenduntur & laxantur intestina: Ob nimiam enim ingestorum copiam vix quoque prompte contrahi possunt, & chyli exitus difficilior fit, & labore plenus, hinc in strenue & assidue potatoribus non raro ita extenditur ventriculus, ut contrahi & corrugari amplius non possit, sed extensus atque extenuatus, anorexias, & debilitates parit perennes. Eadem noxa proposita est a flatibus latera intestinorum nimis distendentibus, assumitis acidis, duris, crassis, austoris nimis, atque acerbis, glutinantibus, viscidis, mucidis, actionem fibrarum impeditibus, & intestinis insensibilitatem inducentibus, potu parciori itemque foecum descensum magnopere retardante. Ex animi pathematibus, hanc minantur diuturnus moeror, & ex reliquis indifferentibus, quies & somnus immodeus, aer humidus, austrinus, vigorem imminuens. Ex rebus præternaturalibus. sequentes nominentur: Affluxus spirituum animalium impeditus, paralysis ventriculi & intestinorum, bilis inertia, aut accessus denegatus, pituita tenax intestinorum lateribus adhaerens, post tumores, vulnerationes & exulcerationes parietum. Intestinorum coalitio, adstrictio & coarctatio; siquidem adeo interdum non solum orificia ventriculi & intestina possunt coarctari, ut nec vapor, nec flatus queant exire, quem affetum PETRUS SALIUS DIVERSUS solum AETIUM descripsisse autumat, similes fere casus FERNEL. Lib. VIII. de part. morb. & sympt. c. 9. MARCELLUS DONATUS Lib. III. P. II. Sec. II. F. GLISSON. de ventricul. & intest. p. 469. retulerunt. Vitium & atoniam ventriculi & intestinorum induciam sequuntur plures morbi chronicci, & pertinaces: apepsia, brydypepsia, alvi obstructio, flatulentiae molestissimæ, malum hypochondriacum &c.

§. XIX.

Tuentur vero eum atq; custodiunt juvant & sollicitant & labescensem erigunt omnia ea, quæ justum robur & tonum fibris motricibus addunt, stabiliunt, conservant easque ad contractionem armant, quæ blando stimulo vellicant ac proritant,

quæ

quæ justum spirituum animalium affluxum in eas procurant. Ejusmodi sunt & quidem ex rebus indifferentibus, aer serenus, tenuis, siccus, frigidior potius quam calidior nimis, tepidus & humidus, quoniam hic destruit, ille erigit vim fibram carnearum comprimentem, ut illo tempore majus est omnium muscularum robur, unde hyeme & frigido Jove melius chylificationem succedere dicitur, atque appetitum magis vigere & ingestiones alimentorum, digestiones, egestiones excernendorum fortius institui experimur. Inter cibos laudantur viliores potius quam delicatores, & qui excrementsa plura quam pauciora relinquunt, quales vegetabilia sunt, atque assati magis quam elixi duriusculi magis quam emolliiti nimis & viscidi, iisque qui sale communi & aromatis bus bene sunt conditi, fermentescibilia, mellita, saccharata, moderato usu adhibita, quæ motus peristaltici exercitium augent. Illudque facilitate lenientia & laxantia, emollientia præsertim in prima mensa assumta, ut pruna damascena cocta, passul. minores, butyrum recens, juscula pingua. Conducunt ex potuum generibus frigida potius quam frequenter tepida, vinum & illud medicatum compositum cydoniatum, absinthiacum, Juniperinum &c. Commendantur motiones corporis convenienter institutæ, in primis equitatio, tornatio, ambulatio, scalarum ascensio, in lecto circumvolutio, quod motionis genus in pertinacissima etiam alvi obstruktione, magno remedio est. Huc trahere liceat, quod pro stabilendo non modo, sed & restituendo motu hoc peristaltico, ambulationem nudis pedibus super stratum lapideum maxime commendet BRASSAVOLA. Proficua quoque sunt infusa & Decocta ex herbis, floribus, lignis, radicibus, seminibusve robustis & aromaticis: hb. veronica, serpil, calamint. salv. majoran. fl. rotmar. rosar. rd. saffparill. lign. saffafraes, fantal. rub. lign. aloes, cort. chin. chacarill. sem. anisi. foenicul. infusa & decocta thee, coffee, chocolatæ, fumus tabaci jejuno præsertim Ventriculo exceptus, thermæ & acidulæ, quæ simul & quantitate & qualitate sua, hunc motum excent. Remedia ea huc faciunt, quæ vires corpori addunt & confortant, aut languidiorem motum blande stimulant, restituunt ac conservant, fibrisque tonum & robur addunt, confortant.

fortantia sic dicta & cordalia, stomachica, nervina, roborantia, ut & aperientia, resolventia, incidentia, quæ pituitam & mucum, qui obstaculo est, attenuant ac removent, sub adstringentia quæ in quovis fere, paucis exceptis, ventriculi & intestinorum affectionibus eapropter convenient, docente etiam GALENO de composit. pharmacop. sec. loc. Lib. VIII. Cap II. terra sigillat & filef. lemnia, martialia, linatura martis &c. Tinctura martis aperitiva, Tinctura Vitrioli martis Zvvelfferi. Ad priorum classem magis pertinent, quæ subtili oleoso, aromatico & salino volatili, resinoso, tenui & gummoso principio praedita sunt, & spirituosa, balsamica, balsam. peruv. de copaiva, de Tolu, de Mecca, & illis paratae Tincturæ & essentiæ, in primis Balsam. vitæ Excel-lentiss. FR. HOFFMANNI, myrrata, terebinthinata, castoreata, succinata, tartarea, crocata, ambrata, cinnabarina, nec non camphorata, spiritus vegetabilium, ut rosarum, fl. sambuci, lilio. or. convall., spiritus mastichin., salia volatilia oleosa, &c. e. g. Sal volatile oleosum Sylvii. Hæc quandoque & imprimis inter pastum assumi possunt. Ad eosdem scopus valent & confect. Alkerimes, completa & incompleta, nux moschata indica, zingiber, calam. aromat. condit, galanga, salina fixa blanda cum terreo salinis, nitrum antimoniatum, sal ammoniacum, sal Glauberi cum sale Ebsoniensi, arcan. duplicat. tartarus vitriolatus, liquor terræ folvat. tartari, tinctura tartari simplex & composita, tinctura antimonii & similia, Essent. absinth. centaur. min. menth. Elixir. Propriet. Paracels. pulv. Cacheet. Quercetan. & similia composta, Elixir. Vitriol. Myns. Tinctura Corall. &c. E re porro sunt Extracta herbar. scord. carduiben. &c. sub forma pilularum alterant: adhibita, ut & pilulæ aloeticæ & laxantes, item ex manna, & rhabobarbar. similibusque lenioribus parata laxantia, pilulæ Becherian. Stahlian. polychrestæ HOFFMANNIANÆ. Nec externa ex aromaticis spirituosis & similibus illinita ab domini, ut & clysteribus injecta (quæ speciatim intestinis crassis prospiciunt) hic de nihilo sunt. Atq; sic exposuimus, quam brevissime potuimus, motum ventriculi & intestinorum peristalticum.

DEO SIT LAUS, HONOR ET GLORIA IN ÆTERNUM!

