

*Cancellaria turricula* foss. LMK. VII.  
116.

- \* *C. proxima* RI. IV. 187. fg. 84.  
 \* *C. muricata* RI. IV. 188.  
 \* *C. Listeri* RI. IV. 188.
- Von Nizza sind mir nicht genug bekannt. Die 2 letzten Arten gehören vielleicht zu *C. hirta*.

*Pleurotoma*.

a. *Pleurotoma: fissura labri a sutura remota*.

215. ! *bracteata* BRN. n. 109. Ba. c. 40.  
*Murex bracteatus* BRCH. 409.  
 Der Einschnitt der äußern Lippe ist sehr abgerundet und nur seicht.
216. . *squamulata* n. Bologna.  
*Murex squamulatus* BRCH. 422.
217. . *Calliope* n. Sy.; Piemont.  
*Murex Calliope* BRCH. 436.; M. (*Pleurotoma*) Bo. 77.
218. ! *rotata* DF. 41. 391.; BRN. n. 115. } Ba. c. 300.  
*Murex rotatus* BRCH. 434.; M. (*Pleurotoma*) Bo. 77. } Ta. c.; As.; Sy.
- var: β. BRCH. 434.
219. ! *monile* DF. 41. 391.; RI. IV. 217.; BRN. n. 116. } Ba. c. 300.  
*Mures monile* BRCH. 432. } Ni.; Sy.  
 Lebt im Mittelmeere.
220. ! *dimidiata* RI. IV. 216; SE. 112.; BRN. n. 114. } Cq.; Ba. c. 1250.  
*Murex dimidiatus* BRCH. 431; M. (*Pleurotoma*) Bo. 78. } Ni.; Sy.; Rg.; Blg.  
 Gegraben auch in Süd-Frankreich (ma).
221. ! *intermedia* n. sp. Cq.; Ba. c. d. 2.  
*P. testa fusiformi; lineis transversis undatissimis impressis, interdum obsoletioribus; anfractibus medio obtuse carinatis, superne incavatis, inferne convexis, ad suturam indistinctis; carina obtusa nodosa, nodis in costas decurrentibus; labri fissura in carinam incisa.*  
 Gänzlich das Mittel haltend zwischen der vorigen und folgenden, in Bildung