

gulis intermediis latitudine aequalibus, prioribus longitudinaliter striolatis, scrobiculatis, intus quoque visibilibus; plica columellae obsoleta.

Höhe 9''' , Breite 6''' . Letzter Umgang mit 35—36 gleichentfernten Queerfurchen; Nabel sehr schwach, doch vorhanden.

362. ! *truncatula* n. sp.

An. d. 2.

T. inflata? BA. 25; ? SE. 100.

T. testa oblongo-ovata; spira acuta, anfractibus aequaliter transversim sulcatis, sulcis quam cingula angustioribus et longitudinaliter striolatis, scrobiculatis; columello uniplicata, attenuata, basi truncatula; labro convexe arcuato; apertura inferius angustata.

Die Beschaffenheit der Spindel so wie des ganzen Mundes ist dieser Art eigenthümlich, und veranlasst mich, sie von *T. inflata* zu trennen, von welcher BASTEROT sagt, dass sie vielleicht mit *T. fasciata* noch vereinigt werden würde. Höhe $4\frac{1}{2}$ ''' , Breite 2''' , Umgänge 4—5.

Die *T. inflata* findet sich auch zu Paris, Bordeaux, in Süd-Frankreich (ma.) und in der Champagne fossil.

363. ! *semistriata* (DF. ms.) BA. 25; DF. 54. } Cq. d. 40.
541; BRN. n. 141. } An. d., Ni.

Voluta tornatilis (LIN.) var: BRCH. 322, 643; SE. 125. [non LIN.]; (sub *Auricula*) Bo. 101.

T. inflata var. α . FÉR. 108.

Speo tornatilis RI. IV. 236.

T. testa ovata; spira acuta; anfractu ultimo ad marginem superiorem et ad basin transversim sulcato; parte mediana inferiore subtiliter transversim striata, superiore laevissima; columella uniplicata; labro fere recto; apertura inferne lata.

Höhe 6''' , Breite 3''' , Umgänge 6—7. Die feinem Streifen der untern Mitte sind auf BROCCI's Zeichnung nicht angegeben.

Gegraben auch in Süd-Frankreich.

364. ? *biplicata* n.

Piemont.

Auricula biplicata Bo. 101.

Bronn, Reise. II.

37