

532. ! *transversa* n. sp.

An. d.; Ni.

L. testa convexa, transversa, ambitu rotundato-anguloso, antice subproducto, natibus protuberantibus subacutis, incurvis, anum profundum involventibus, superficie nitida, irregulari, rugosa.

Breite 12''' , Länge 10''' , Dicke 6''' .

Vergl. *Lucina gibbosula* DF. DH. I. 93.

533. ! *globosa* n.

Cq. d. 1.

Venus globosa (LIN.) BRCH. 554.

? Lebt im rothen Meere.

534. ! *scopulorum* BRG. 79; BA. 87; SE. 146.) Su.

Gegraben um ? *Paris, Bordeaux* und *Ro. b.* in Süd-Frankreich (c. ma.).

535. . *gibbosula* LMK. var. BRG. 79; BA. 87. Cg. a.; Ro. b.

Lebend an der Nordküste *Frankreichs*.

Fossil um *Paris, Bordeaux*.

' *Loripes densa* RI. IV. 344. (quartiär) von *Nizza*.

Donax.

536. ! *fabagella* LMK. V. 525. var. *abbreviata*. Cq. c. 1. (BRN.)

? *D. semistriata* RI. IV. 341. Die Beschreibung würde gut zu unserer Art passen, aber ich finde hinten, was R. vorn angiebt, u. u.

Lebt im Mittelmeere.

537. ! *anatinum* LMK. V. 525.

Cq. d. 1.

Lebt im Mittelmeere.

538. ! *longa* n. sp.

Cq. d. 10.

D. testa laevi, transversim ovato-oblonga, latere posteriore anteriorem fere aequante, margine edentulo.

Diese Art ist mehr verlängert, als irgend eine andere mir bekannte.

Länge 12''' , Höhe 6''' , Hinterrand 6''' , Vorderrand 8''' .

539. ! *minuta* n.

An. d.

D. trunculus (LIN.) BRCH. 537 [non LIN. LMK.)

? *D. anatinum* β . *minor*. BA. 83.

? *D. Brocchii* DF. coll.

? *Burdigalensis* DF. 13. 425.