

548. ! *gigas* LMK. V. 557; ? RI. IV. 352; } Cq. c. d. 10.  
BRN. n. 178. } An. Ni.

< *Venus Islandica* (LIN.) BRCH. 554.

[non LIN.]

549. ! *aequalis* n. } Cq. c. d. 30.

*Venus aequalis* Sow. I. 59. tf. 21. } Ni.

*Cyprina umbonaria* LMK. V. 559; RI.  
350.

*C. angulata* BRN. n. 179.

Mantel-Eindruck einfach.

Fossil auch in *England*.

550. ! *islandicoides* LMK. V. 558; excl. syn. Cq. c. 150; An.  
BA. 91; BRN. n. 180.; SE. 147.

< *Venus Islandica* (LIN.) BRCH. 554.

[non LIN.]; ST. 393.

*Conchites Islandicae* SCHF. 175.

Ist mehr mit *V. planus* als mit *V. aequalis* Sow. verwandt, doch verschieden in Form und Schloß. Der Mantel-Eindruck ist hinten tief eingebogen.

var.  $\beta$  *inflata* BRCH. 557; BRN. n. 181.

Fossil auch in ? *England*, um *Bordeaux*, in *Süd-Frankreich* (s. c. ma.), in *Molasse* der *Schweitz*, und im *Maynzer* Becken.

551. ! *affinis* BRN. n. 182.

Cq. c. 55.

< *Venus pectunculus* (LIN.) BRCH.  
560; (non LIN.)

Mantel-Eindruck eingebogen.

Fossil auch um *Maynz*.

552. . *corrugata* LMK. V. 558.

*Italien*.

553. . *tridacnoides* LMK. V. 558.

*Italien*.

\* *C. Islandica* (LMK.) RI. } *quartiär*, von  
IV. 352. } *Nizza*, bedürfen

\* *C. Montagui* (LMK.) RI. } weiterer Prü-  
IV. 353. } fung.

### *Cytherea*.

554. ! *cycladiformis* BRN. n. 183.

Cq. (c.) d. 250.

< *Venus pectunculus* BRCH. 560. (non Ni.

LIN.); ? SE. 150.

? *Venus Arctoe* RI. IV. 360.

Lebt im *Mittelmeere*.

Fossil in *Süd-Frankreich* (ma.), in *Siebenbürgen*.