

593. . *Clodiense* BRCH. 500; DF. 5. suppl. 109; Sy. ST. 393; RI. IV. 337.

Gegraben in Molasse der Schweiz.

594. ! *echinatum* BRU.; BRCH. 502; BA. 82; BU. } Cq. d. 30.
C. echinatum var. *b.* LMK. VI. I. 17; BRN. }
 n. 202; SE. 145.

Lebt im Mittelmeere.

Gegraben um Bordeaux, in Süd-Frankreich (ma.), Podolien, im Wiener Tegel.

595. ! *tuberculatum* LIN. BRCH. 503; LMK. } Cq. c. d. 550; An.
 RI. IV. 335; BRN. n. 203; SE. 144. } Ni. (quart.)
 var. *β. mutica* BRN. n. 204.

Lebt im Mittelmeere.

Gegraben in Süd-Frankreich, in Molasse der Schweiz (BRN.).

596. ! *aculeatum* LIN. LMK. VI. I. 7; RI. IV. } Cq. c. d. 10.
 332. } An.

Lebt im Mittelmeere.

597. ! *ciliare* LIN.; var. *γ.* BRCH. 502. 667. } Cq. c. d. 25; An.
 — var. *a.* LMK. VI. I. 6; BRN. n. 205. } Ni. (quart.)

var: *costis triquetris*, anterioribus 6. lamelliformibus.

? RI. IV. 335; ? SE. 144.

Lebt im Mittelmeere.

Gegraben noch in Süd-Frankreich (ma.).

598. ! *Deshayesii* PA. 56. Cq. c. d. 290.

var. *α. costis* 21, anterioribus 6 minoribus; tuberculis brevioribus obtusioribus densissimis. Cq. 65.

C. dubium var. *α.* BRN. n. 206.

< *C. ciliare* BRCH. 501.

? *C. ciliare* var. *b.* LMK. VI. I. 6.

? *C. gibbum* DF. 5. suppl. 107; an.

? *C. lamellosum* — — — 108.

var. *β. major*, *costis dorso complanatis*, tuberculis remotioribus. Cq. 225.

C. dubium var. *b.* BRN. n. 207.

Lebt im Mittelmeere.

599. ! *hirsutum* n. sp. Cq. c. 2.

C. testa parva, inflata, obliqua, latere posteriore obsolete angulata, ubique radiatim costata, costis subaequalibus 34—35, squamas erectas curvatas densissime imbricatas gerentibus; margine infero-postico productiore.