

618. ! *nodulosa* (LIN.) BRCH. 478; DF. 2. suppl. } Cq. d. 10.; An.
116. } Ni. Ischia.

A. modiolus ? OL. 115.

A. lactea RE.

A. navicularis CORTESI Sagg. geol. p. 42.

A. reticulata RI. IV. 311. fg. 171.

a. A. Quoyi PA. 62; SE. 140.

β. ? A. Gaimardi PA. 61; SE. 139.

Lebt im Mittelmeere.

Gegraben in Süd-Frankreich (ma.).

619. . *didyma* BRCH. 479; RI. IV. 315.

} As. Bologna.

} Ni.

620. . *clathrata* DF. (1816) LMK. VI. I. 46; Ni.
BA. 75.

A. squamosa LMK. VI. I. 45.

? Lebend in Neuholland.

Gegraben noch um Bordeaux, Angers.

621. ! *Pandorae* BRG. 76.

Cg. a.

622. ! *Roncana n. sp.*

Ro. b.

A. testa oblonga, transversa, depressa, subsinuata, transversim sulcosa, antice et media longitudinaliter striata; plano declivi posteriore laevi; umbonibus fere contiguis, margine integerrimo.

Höhe 9^{///}, Breite 16^{///}, Dicke 4^{1/2}^{///}.

Pectunculus.

623. ! *polyodonta* BRN. n. 212.

} Cq. c. d. 350.

P. pulvinatus var. 3. LMK. VI. I. 54.

} An. Ni. Ischia.

var. α. Arca polyodonta BRCH. 490.

Cq.

P. polyodontus RI. IV. 319.

var. β. lenticularis, tenuior.

Cq.

? *Arca flammulata* RE.

? *Arca undata* BRCH. 489.

P. undatus RI. IV. 317.

var. γ. magna, tumida, crassa, dentibus mediis oblitteratis.

An.

Arca pilosa BRCH. 487.

Die beträchtliche Gröfse, die geringe Konvexität, die aneinander liegenden, wenig vorstehenden Buckeln, die gerundete, etwas schiefe Gestalt, woran der Querdurchmesser (obschon sehr veränderlich) nur selten etwas gröfser, oft aber kleiner