

Queere verlängert; Längestreifen kommen nur vor, wo die Schaaale schon etwas zerstört ist.

Breite 7^{///}, Höhe 6^{///}, Dicke 3^{///}.

634. ! margaritacea LMK. VI. I. 59; BA. 78; } An. d.
DF. 35. 216; RI. IV. 319; SE. 142. BU. } Ni. Ischia.
< Arca nucleus minor BRCH. 480.

N. trigona So. II. 208. tf. 192. fg. 5.

Ist kleiner, kürzer als beide vorigen, mehr dreieckig, die *lunula* länglich eyrund, den Vorderrand etwas ausbiegend; stimmt völlig mit unsern Exemplaren aus dem *Mittelmeere* überein.

Lebt im *Mittelmeere*.

Gegraben um *Bordeaux*, *Paris*, *Maynz*, in *England*, *Süd-Frankreich* (ma.), *Siebenbürgen*, *Podolien*.

635. ! nitida DF. 35. 217. 219. Cq. d. 10.

Arca nitida BRCH. 482.

? Corbula nitida RI. IV. 365.

var. β . striata.

636. ! concava n. sp. Ta. c.

N. testa rotundato-triangulari, gibba, concentrice striata, umbonibus medianis tumidis; postice rotundata, sine linea longitudinali, antice subacuta; lunula lata impressa, angulo obtuso circumscripta.

Der folgenden sehr ähnlich, doch unterschieden durch den Mangel der hintern Längelinie, das stumpfere, kürzere Vorderende, den stumpferhabenen, die Lunula umgebenden Rand.

Länge 3^{1/2}^{///}, Höhe 2^{1/2}.

637. ! striata LMK. ann. DF. 35. 218. } Cq. d. 450; Ta. c.
Arca minuta (LIN.) BRCH. 482. } An. d.; Ni. Bol.

N. minuta BRN. n. 221; SE. 141.

Lembulus deltoideus RI. IV. 320. fg. 164.

var. β . tenuistriata (elongatior, tenuius striata, plica longitudinali elevatiore in extremitate rotundata.)

? Lembulus rostratus RI. IV. 320.

Fossil auch in *Süd-Frankreich* (ma.), *Siebenbürgen*, im *Wiener Tegel*.