

Tertia est earum, quæ habent saporem amarum, adeoque in suo concreto constant. Θ \odot lo Tattareo. Tales sunt Carduus benedictus, fumaria, lupulus, vulneraria pleraque & similia. Subministrant ∇ & imprimis ex illarum succo elicitor Θ essentiale, quod rectificatum super proprios cineres degenerat in perfectum Θ , unde vis diuretica.

Quarta est earum, quæ saporem habent admodum acrem & mordicantem, quales sunt omnes species Thlaspi & omnia raphanacea, cespacea & antiscorbutica. Subministrant Θ volat. parum acre Δ reum, & tam fermentando, quam cum V elicitor \sim vini acris, melior tamen per fermentationem. Qui enim per V destillatur, magis de V quam \sim proprio possidet.

Quinta denique Classis eas continet plantas, quæ habent odorem fortē & penetrantem, saporem verò nunc amaricantem, nunc suavem, quales v.g. sunt Majorana, Rosmarinus & omnia aromaticā. Vis eatum later in Θ vol. \circ so. Subministrant aquas nonnihil spirituofas, olea destillata & fermentando \sim ardentes: Calcinando verò Θ ia alcalia fixa.

II. *Vegetabilia distinguuntur in FLORES sub triplici Classe contentos, quā um prima est eorum, qui sunt inodori, uti sunt flores Nympheae. Dant \rightarrow blandum & succum exprimendum seu inspissandum, & in iis later alcali & Θ vol. blandum. Secunda eorum, qui habent odorem suavem, sed superficialem, & facillimè evanescēt uti sunt Narcissi, Violæ, Jasminus & ex parte et-*

iam Rosæ. Vis eorum est in parte Θ iali volatile. Sal habent volatile, quod figitur, si oleum eorum paretur cum baccis been vel amygdalis. Terti Classis flores habent odorem fortē penetrantem & aromaticum, ut sunt flores rosmarinii. Soppeditant aq. \sim uosam, oleum & spiritum. Vis fundata est in Θ vol. & \circ .

III. Occurrunt SEMINA, quorum marina vis est, & subdividuntur I. In ea, quæ abundant succo mucilaginoso aqueo, qualia sunt sen, cydon, psyllii, lini &c. 2. In ea, quorum vis latet in \circ , sed aquoso, faciliter resolubili & expressibili v.g. sem. papav. &c. 3. In ea, quæ sunt acria, ut sem. sianpi, cochleariae &c. quorum vis in Θ vol. admodum acri, simul tamen oleoso consistit, unde tam fermentando quam cum spir. vini ex ii: elicitor \sim vol. 4. In ea, quæ odore suavi & sapore grato sunt prædicta v.g. semen anisi, sonculi &c. quorum vis consistit in copioso oleo volatile seu Δ , quod in recessu habet Θ volatile.

IV. *TanDEM LIGNA se fistunt, quæ vim suam Θ acido volatile debent. Proinde larguntur spiritum acidum, qui in recessu habet Θ vol. cujus rei testimonium perhibet fuligo, cum qua prodit \circ forte sed fœtidum. Omnia tamen ligna infimul dant \rightarrow .*

Hæc erant generalia de Vegetabilibus primitenda. Jam ad specialiora, nempe ipsas plantas progredimur, adeoque ad ductum AUTHORIS NOSTRI totum negotium certus Classem includemus.

C L A S S I S I.

D E

ALTERANTIBUS PRIMARIIS, QUÆ SUNT PLANTÆ HARUMQUE MEMBRA, &c.

A B I E S.

Hæc duplex est, alba & rubra: differentia est in forma externa, & exilis, nec multum refert, si omnino negligatur. Abies hæc rubra vocatur etiam imprimis picea seu pinus, der Gichtenbaum / quæ non debet confundi cum propriè sic dicta pinu, der Tanne: Alio nomine hæc picea seu pinus vocatur arbor antiscorbutica, propter insignes & maximè stupendas virtutes, quas exserit pinus & etiam abies in cura Scorbuti. Veteres parum aut nihil sciverunt de virtute ejus antiscorbutica, sed superioribus tantum annis illa innovuit, tunc temporis cum VLADISLAUS, Rex Poloniae bellum contra Moscovitas gereret: tunc enim morbus talis Epidemicus in castris grassatus fuit, ut militibus quasi crura convellerentur & contraherentur, qui tamen morbus fuit curatus à D. ERBENIO Archiatro, &c. per decoctum summatum pini: Et simul deprehensum postmodum fuit, quod tales contracturæ sint paralyses scorbutica: Omnes tunc temporis milites cum decocto hoc feliciter fuerunt curati: Ab isto tempore PICEA & PINUS in usum antiscorbuticum furent tractæ: nec sine causa: Nam in abiete plura latitent arcana: singulare in se habet balsamum, id quod testatur pinguedo, & vis qua viret perpetua fronde, ita ut alperrimas hyemis inclemencias negligat.

Primarius usus est in Scorbuto, tantum decoctum foliorum imprimis in Batavia. Loco sum-

mitatum etiam usurpantur STROBILI juniores, die kleinen zarten Zapfgen / tactu admodum resinosi ac vilcosi & apparent adspersi quasi ferrina flava. Hi ipsi strobili juniores, si non preferendi faltem æquale sunt summatibus pini, & in decocto quoque usurpari possunt contra scorbutum. Ex his strobilis junioribus per fermentationem artificiale elicitor spiritus, qui spiritus strobilorum seu spiritus pini habet odorem instar cumini: & cum hoc spiritu postmodum paratur ESSENTIA pini, quæ est egregium remedium antiscorbuticum: in specie in arthritide scorbutica vagâ, item in paralyse scorbutica, in der reissenden fahrenden Scorbutischen Gicht. Dresden prostat ∇ pini cum vino præparata, quæ est egregia, in atropus Scorbuticas, & aliis affectibus scorbuticis.

Ipsa abies singulare est antipodagricum & antiarthriticum: non tantummodo in arthritide fixa comuni, sed specialissimè in arthritide scorbutica vaga. Reperitur interdum VISCUS in abiete sed raro: Hic est singulatiter expensus in arthritide comuni podagra, si pulverilatus a 3β . ad $3j$. singulo matutino tempore sumatur. Puræ qui cupit de virtutibus antiscorbuticis abietis & pini, vid. MÖLLENBROCK. tract. de arthritide vaga pag. 117. Rarum est, quod habet MAJOR in deliciis hybernis momento secundo: nec apud ullum alium autorem simile, quid reperiri credo, quod nempe

nudus