

der Wurzel, wächst das ganze Jahr und gedeiht im trockensten Sandboden auf Bergen, Felsen und Sandebenen, ist zwei- und dreimal zu nutzen; *Poterium sanguisorba*, gemeine Bibernelle, schwarze Pimpinelle, ein Lieblingsfutter der Schafe; *Anthoxantum odoratum*, Ruchgras, wahres, gelbes, auf Sandboden, gedeihlich den Schafen, feines aromatisches Geruch, insbesondere jung genossen ein gesundes, wohlschmeckendes, nahrhaftes Futter; es säet sich auf magerem sandigen Boden von selbst an; *Pulmonaria officinalis*, officinelles Lungenkraut, blaue Schlüsselblume, blüht schon im März und zwar auf trockenen, sandigen Weiden und in Heidegegenden in Wäldern und Gebüsch; *Spergula arvensis*, Spergel; *Nardus stricta*, Borstengras, haarförmiges Pfriemengras, bildet einen dichten Rasen mit vieler Wurzel und zeigt sein Standort im wilden Zustande oftmals Wasser im Untergrunde an; *Chrysanthemum segetum*, Wucherblume, Ackergoldblume; *Tragopogon pratense*, Bocksbahrt, Haferwurzel, wilde Skorzonere mit starker spindelförmiger Wurzel, blüht im Mai und reift im Juli und kommt auch auf dem Sande fort; *Heris nudicaulis*, Sandzungenblume, gemeiniglich auf sandigen Weideplätzen, ein vorzügliches Schaffutter; *Achillea millefolium*, Schafgarbe, Feldgarbe, auf Weiden und Tristen sehr gemein; ein vorzügliches Schaffutter; *Cynosurus cristatus*, gemeines Kammgras, auf trockenem und feuchtem Boden, Wiesen und Weiden, blüht im Juni und Juli, hat eine faserige Wurzel und ist ein angenehmes Futter; *Vicia Narbonensis*, Narbonische Wicke; hält auch in Deutschland die härtesten Winter aus, wächst stark in's Kraut, treibt viel Saamen und ist ein sehr zeitiges Weidefutter; *Festuca ovina*, Schafschwingel, kleine Bocksbahrt, ein vorzügliches Schaffutter auf trockenem Sandboden, sonnigen Hügeln und in Nadelhölzern, blüht im Mai und Juni und giebt mit einigen andern Grassämereien, als weißem Klee, englischem Raygras, Hopfenlucerne und Pimpinelle, eine sehr passende Schafweide; *Festuca rubra*, rother Bocksbahrt auf trockenen, sandigen Wiesen und Weiden, Hügeln und schattigen Plätzen, blüht vom Mai bis Juli; *Holcus lanatus*, Roßgras, wolliges Honiggras, wollige Moorhirse, streut viel Saamen aus; *Holcus mollis*, weiches Honig- oder Roßgras, wegen häufig wuchernden Wurzeln als