Secundum vero habitus corporis in mollibus carne
et albis quales sunt celte. Secundum horis autem
subcutanee. Similiter autem secundum regiones et con
stitutiones secundum alterum modum ut dictum est
autem in contrariis. quod equa in frigidis horis et
regionibus veremur evacuationem copiosam
propter assequentem infrigidationem. Nequaquam igitur
possibile est conscriptionem in unoquoque pre
dictorum unam determinare evacuationis men
suram. Vidi enim in quibusdam quidem suf
ficienter auferentes sex libras sanguinis ut et
febris confestim extingueretur et nulla
assequeretur maligniatio virtutis. In qui
busdam autem et mediam non absque hoc quod brevem a
liquo sedere virtute. In quibus si duas quis eva
cuasset nocuisset utique ultime. Propter
hoc igitur novem et unam auferre libram quandoque
proficue et quandoque et hec minimas a vena que
secundum cubitum et inguine et cavilla
Rursum ab eis que iuxta magnos conos octo
et sub lingua nichil iuvare asserunt
dignum ratione. quemadmodum neque si quis ea
que in pedibus et summis manibus incidat vena
et qui splenem curam extimant ab ea
que maxime secundum parvorum digitorum vena
incisa de qua amplius consequenter dicetur.

Capitulum xviii de qualitate flothomie

Quecumque igitur et de hac consideratione
dicta sunt a medicis si scribere vo
luero opus erit michi libri magni per se
plenum. Quemadmodum enim in aliis que usque
huc sermonis determinata sunt mette meam
vobis duxi ad memoriam cum iamque videritis
operibus ipsam attestatam ita et nunc agam pri
sermonis faciens ex hiis que manifeste cotidie vi
dentur in egrotantibus que primo ypocras di
ligenter observans scribit. Est autem ipsorum
unum quidem et primum capitulum quandoque
tractum emorosagiat maximum iuvamen
egrotantibus. Tractum autem quod
secundum rectitudinem distat omnibus confessum est
maxime convenire multotiens in hac signi
ficato ea que tractum voce. Hec autem
econtrario emorragisantia nichil iuvare
et nocere quandoque in dissolutionem virtute
absque quod passione allevient. Neque enim in
splene magno naris dextra emorrogizans
neque sinistra in epate feret aliquid iuvamen
Secundum antispasis in hiis que secundum rectitudinem
antispatum eiusdem iuvamen celeriter ostendit
In hiis vero que econtra nequaquam. Dextra
quidem igitur emorragisante nare que secundum
dextrum ypocondrium firmatur ventosa
cito et fiunt celeriter emorragia. Quemadmodum
que secundum sinistram emorragisante sinistra.
Et flothomias quidem contra antispasis in
ea quidem que secundum rectitudinem emorragia ce

leriter videbis manifestum iuvamentum. E
converso autem si incideris nullum iuvamen.
Itaque minimum et splene patiente eius
que secundum anularem digitum vene incisio in
nuit ex sinistra manu nisi et ea que in cubito
venam incidas que intus. Iuvat enim
sufficienter splenem malignantem evacuatio
sanguinis ex sinistra manu. Melius autem est
non semel evacuare quod commensuratum sed
in duos partiendum dies. Non tamen sum
ignorans quod medicis neglectum est flothomare
spleneticos. Ego enim semper magnum iuva
men novi fiens si et libram quis evacuaverit
unam. Secundum quantitatem itaque evacuationis
ex predictis considerationibus oportet facere.
Et quidem itaque in pleureticis que secundum
rectitudinem patientis lateris flothomia iuva
men evidentissimum ostendit multotiens. Que
vero ex opposita manu sit primum vel omnino de
nuo post tempus. Doloresque multos oculorum
fortissimos infra unam horam sedavit que secundum
rectitudinem flothomia humeralis vocata vena incisa.
Temptare autem in omnibus passionibus melius est
in flothomiis moderate fientibus vocatam
superablationem facere quandoque quidem in una die
qui ita agere potuerit seu competit quandoque autem
secundum secundam partem si alii ut antea dictum est
usque ad defectionem animi ducere evacua
tionem satagemus. Igitur in oculis quidem
humeralis vocata vena et que ab inciditoribus
secundum cubitum incise manifeste velociter
sunt iuvamen. In lateribus autem patiente vel
pulmone vel dyafragmate vel splene vel
epate vel ventre ea que parallela ad ea que
secundum cubitum articulatione proveniat incidere
autem secundum hoc maxime autem ipsam que ita.
Si vero non evidens que ab ipsa absonditur
in evacuatione de articulationis qua situ
utique alicubi ab humerali vena abscindi
et ei que predicta est copulari ipsam. Tria
enim hec loca eius que secundum cubitum flothomie sunt
Quorum intus et qui extra et medius. Igitur que
quidem intus in hiis qui in inferioribus
a collo patiuntur iuvativus est. Que vero
extra in eis que supra hoc vel facie vel
capite. Predictus vero locus quandoque quidem utique
habet eas que abscise sunt venas ad anteriorem
manus extensas deinde ibi copulatas. quandoque
autem confestim in idem sibi invicem euntes secundum
[illegible] de articulationis. Est autem quandoque quidem
manifesta altera immanifesta vero alia.
Quandoque igitur immanifesta existente que famu
liaris patientis participale vena ad aliquam me
diarum accedis tempta abstinere a fa
miliari incidere magis. Est autem quando et eas
que inferius sunt eius que secundum cubitum de
articulationes quecumque secundum brachium sunt