

Das II. Capitel.

Wie man unfruchtbare Bäume fruchtbar machen könne?

Solches geschieht ordinarie durch Alderlassen/Fontanell setzen/Schröpffen/und purgiren zc.

S.1. Die erste Weise durch Alderlassen! geschieht also: Den unfruchtbahren Baum seine Wurzel/so weit sich die Aeste von oben außbreiten/wird umgegraben/und behände mit der Hand/oder subtilen Hacke/das sie nicht beschädiget werden/ gereiniget: hernach suchet man die Mutter = Wurzel aus / als welche die vornehmste/und die dickste ist/ (in den dicken Stämmen findet man solcher zuweilen 3.4.6. auch 10.) dieselbe muß ein wenig aufgespalten oder aufgerisset werden. Wenn dieses geschehen / treibet man einen Keil von frischen Hagedorn in selbige Spaltung / und beschmieret außserhalb so wohl den Keil/als auch die Wunde oder Wurzel umb und umb / mit der gemeinen Baum-Salbe/oder auch mit Schaffmist/wenn es Aepffel oder andere Früchte seyn; sind es aber Birnen/so muß mit Schweinmist geschehen. Nachgehends wird die Wurzel wieder mit reiner und fetter Erden beworffen / und eingetreten/ gleich als wäre der Baum erstlich von neuem gesetzt worden.

S.2. Der Herr M.I. Schwimers in seinem Physis. Lust-Garten beschreibet die Ursache weitläuffrig / war