

- e) Mit büstenartigen Fühlhörnern. pag. 240.
- f) Länglichte, deren Fühlhörner büstenartig und  
so lang als der Körper sind. 241.
- g) Langhörner. 241.
- III. Abtheilung. Mit andrigen Flügeln.  
Neuroptera. 241.
- XXXV. Gattung. Die Wasserjungfer.  
Libellula. 241.
- a) Mit ausgebreiteten Flügeln ruhend. 241.
- b) Mit weit auseinanderstehenden Augen. 242.
- XXXVI. — Die Wassermotte. Phry-  
ganea. 242.
- XXXVII. — Die Flohfliege. Hemero-  
bius. 242.
- XXXVIII. — Die Scorpionfliege. Pa-  
norpa. 242.
- XXXIX. — Die Kameelfliege. Raphi-  
dia. 242.
- IV. — Mit häutigen Flügeln. Hy-  
menoptera. 242.
- XL. — Die Blatwespe. Tenthre-  
do. 242.
- a) Mit abgestuften Fühlhörnern. 243.
- b) Mit ungegliederten Fühlhörnern. 243.
- c) Mit drathförmigen Fühlhörnern. 243.
- XLI. — Die Schwanzwespe. Sirex. 244.
- XLII. — Die Schlupfwespe. Ichneu-  
mon. 244.
- XLIII. — Die Bastardsandwespe.  
Spheg. 244.
- XLIV.