

Chrysomela boleti, LIN. Das Schwanenhänchen.
Lin. p. 591. 36.

Chrysomela sanguinolenta, LIN. Das Bluthänchen,
aus Europa. Lin. p. 591. 38.

Chrysomela marginata, LIN. Der Saumflügel, eben
daher. Lin. 591. 39.

b) Springhänchen mit dicken Hinterbeinen.

Chrysomela oleracea, LIN. Der Gartenhüpfer, eben
daher. Lin. p. 593. 51.

Chrysomela nemorum, LIN. Das Waldhänchen.
Lin. p. 595. 62.

c) Mit rundem Körper.

Chrysomela cyanea, LIN. Der Blausling, aus Ame-
rika. Lin. p. 596. 72.

Chrysomela tridentata, LIN. Der Drenzhahn, aus dem
pyrenäischen Gebürge. Lin. p. 596. 73.

Chrysomela quadripunctata, LIN. Der Schwarz-
punkt, aus Europa. Lin. p. 596. 76.

Chrysomela merdiger, LIN. Das Lilienhänchen.
Lin. p. 599. 97.

d) Mit länglichen Körper und schmaler Brust.

Chrysomela duodecimpunctata, LIN. Der Inländer,
die Larve, hält sich auf dem Spargel auf. Lin.
p. 601. 110.

Chrysomela asparagi, LIN. Das Spargelhänchen.
Lin. p. 601. 112.

XI.

Der Stachelkäfer. Hispa.

Hispa atra, LIN. Der Schwärzling, aus dem nordi-
schen Europa. Lin. p. 603. 1.