

Zu der VII^{ten} Gattung der II^{ten} Abtheilung von
Vögeln kommt noch ein neues Geschlecht dazu:

Der Neuntöder. Lanius.

Lanius Excubitor. Der Wächter. Linn. p. 135. 11.
(in der 4ten Schubl.)

Zur XXX^{ten} Gattung der IV^{ten} Abtheilung von
Fischen.

Gymnotus electricus, f. Tremulus. Der Zitteraal. Er
hält sich bey Surinam und andern amerikanischen Flüs-
sen auf, der größte dieser Art soll die Länge von 5 Schuh
haben und von solcher Eigenschaft seyn, daß ein jeder, der
ihn berührt, oder zu nahe kommt, einen heftigen elektri-
schen Schlag von ihm bekommt. Linn. p. 427. 2.
(in Spir. No. 814.)

Zur XX^{ten} Gattung der III^{ten} Abtheilung von
Amphibien:

Coluber coeruleus. Die blaue Natter, aus Indien,
eine Verschiedenheit.
(in Spir. No. 674.)

Zur III^{ten} Gattung der I^{ten} Abtheilung von Ge-
würmen:

Helix Gualtierana. Die Neschnecke. Gualt. T. 68. f.
E. Linn. p. 1243. 670.
(in der 30sten Schubl. No. 42)

Zur XII^{ten} Gattung der I^{ten} Abtheilung:

Voluta Mitra papalis. Die Papstkrone; davon 6 kleine
Stücke. Linn. p. 1193. 94. 425.
(in der 59sten Schubl. No. 3.)

Zur XIV^{ten} Gattung der I^{ten} Abtheilung:

Conus auriliacus. Der Orangenadmiral. Es ist einer der
vornehmsten Admirale aus Ostindien, und in wenig Ka-
binetten zu finden. Der meinige hat die Größe von 2
Zoll