

In 100 Gewichtstheilen lufttrockener Blätter:

Ausziehbare Theile,

durch	Wasser . . . . .	<b>22,467.</b>
	Aezkali . . . . .	<b>56,108.</b>
	Alkohol, an Harz u. Wachs.	<b>1,848.</b>

Pflanzenfaser . . . . . **15,577.**

Nährhafte Bestandtheile der getrockneten Blätter **78,5** pSt.

Aschengehalt des lufttrockenen Laubes **7,096.**

Bestandtheile dieser Asche:

<b>1,072</b> Kali,	<b>0,020</b> Eisenoxyd,
<b>0,132</b> Natron,	<b>0,932</b> Phosphorsäure,
<b>3,964</b> Kalkerde,	<b>0,315</b> Schwefelsäure,
<b>0,332</b> Bittererde,	<b>0,045</b> Chlor.
<b>0,284</b> Kieselerde,	

Futterwerth des Laubes: **125 — 150** Pfund sind gleich 100 Pfund Wiesenheu.

### Ahorn, Acer pseudoplatanus.

Bestandtheile des Laubes: (Nach Sprengel.)<sup>1)</sup>  
Feuchtigkeit **59** pSt.

In 100 Gewichtstheilen lufttrockener Blätter:

Ausziehbare Theile,

durch	Wasser . . . . .	<b>10,934.</b>
	Aezkali . . . . .	<b>66,089.</b>
	Alkohol, an Wachs u. Harz	<b>2,492.</b>

Pflanzenfaser . . . . . **20,485.**

Nährende Theile der getrockneten Blätter **77** pSt.

Aschengehalt des lufttrockenen Laubes **11,532.**

Bestandtheile der Asche:

<b>0,931</b> Kali,	<b>0,030</b> Eisenoxyd,
<b>0,580</b> Natron,	<b>2,390</b> Kieselerde,
<b>4,486</b> Kalkerde,	<b>1,536</b> Phosphorsäure,
<b>0,600</b> Talerde,	<b>0,689</b> Schwefelsäure,
<b>0,005</b> Alaunerde,	<b>0,285</b> Chlor.

Futterwerth des Laubes: **125 bis 150** Pfund sind gleich 1 Ctr. Wiesenheu.

### Anis, Pimpinella anisum.

Vegetations-Verhältnisse: Hält sich **9 — 10** Jahre, wenn der Samen zur Abhaltung der ihm nachstellenden weißen

<sup>1)</sup> A. a. D.