

LECTORI - BENEVOLO
FACULTATIS MEDICÆ
LIPSIENSIS

p. t.

PROCANCEL-
LARIUS
D. IOHAN. GVLIELMUS
PAULI,

ANAT. & CHIRURG. P. P.
S. P. D.

de glandulis Controversia.

Anat.


B.

3,46

Dig. anat. 360

21. 1759. 1607. 1
ЗОДЕНСКАЯ ПОДАЧА
ЗМЕЕВСКАЯ

1759. 1607. 1
ЗОДЕНСКАЯ ПОДАЧА
ЗУМЕЕВСКАЯ ПОДАЧА
1759. 1607. 1
ЗОДЕНСКАЯ ПОДАЧА
ЗУМЕЕВСКАЯ ПОДАЧА



J. J.



Nter omnes solidas corporis ani-

malis partes, quanto frequentiores deprehenduntur glandulæ, quantoque frequentior harum mentio injicitur, tanto spissioribus tenebris earundem conformatiōnē ac diversitatem esse circumfusam, vel ex ipso Clarissimorum Anatomicorum & Physiologorum de talibus luculenter elucescit dissensu. Dissensum equidem fusius nolo nunc commemorare, quem magni nominis Viri, King, Malpighius, du Verney, Bellinus, Bidloo, Pitcarnius, Vieussens, Bærhaave, &c. de glandularum structura in genere inter se foveant; nec, in quantum circa discepantiam eorum a Sylvio, Stenone, Graafio, celeberrimis experientissimi Losius, Beddebole, Nuckius, Ruysschius, recedant. Prorsus tamen intactum relinquere nequeo, dum ex tot famigeratissimorum Victorum cum dissensu, tum consensu, materiae adeo obscuræ obscuram præferre facem in præsenti annitor, veniam & informationem ab oculatiōribus, ubi caligavero, haud difficilem mihi promittens. Scilicet quo caligo circa generalem glandulæ texturam quodammodo dissipetur, ante omnia unanimis Recentiorum consensus videtur supponendus, quo glandulæ in genere non aliud, quam colatorii & filtri decernitur munus, huic jam exe-

A 2

quendo

quendo quia non nisi conveniens pororum habitudo valet debetque concipi , ex ipsa tali omnem glandulæ conformatiōnem in genere resultare protinus clarescit , sive glandula ipsa fluido alicui solummodo transcolando , sive ab altero potius fluido sequestrando , cum industrio *Nuckio* asseratur in specie inservire . Hinc quoniam ingeniosus *Pitcarnius* nonnullique pororum ejusmodi glandularum cum fluido , vel transmittendo , vel secernendo , convenientiam majori probabilitate in sola magnitudine indagant , hoc magis figura , quam plerique alias simul cum magnitudine in hoc negotio respiciunt , poterit seponi , quo promptius crassiores etiam humores a tenerioribus sic secerni posse postea demum exponam , quam specialiorem porro texturam glandulæ , tum transcolantis , tum separantis , ad *Nuckii & Bellini* ductum , cum varia utriusque differentia , indigitavero . Solertissimi namque *Nuckii* observationi exactiori debetur , quod porositas glandularum , quas congregatas appellant , a textura fibrosa , veluti muscosa , promanet , eaque intercedente lympha , per lymphatica adduentia quæ accedit , per lymphatica vasa alia reducentia remitt transcolata subtilior , exemplo glandularum mesenterii manifestissimo . Hasce autem inter glandulas congregatas quemadmodum , præter alias notissimas , pinealis glandula ob vasa lymphatica , quæ duplicitis generis perspicacioribus in illa cernere licuit , jure meritoque a laudato *Nuckio* refertur , ita & pituitaria singularem invenire videtur locum , quod corpus spongiosum , i.e. fibrosum , texturæ tenuissimæ a *Vieussenio* annotetur , atque lympham per infundibulum a cerebri ventriculis acceptam filtrando ad venosos sellæ turcicæ sinus transmittere a Clarissimo *Litre* ostendatur , etiamsi vasis proprie dictis lymphaticis , cum advehentibus , tum revehentibus , destituatur . Sique congregatae ejusmodi glandulæ a lymphæ transcolatione , cui vacant , lymphaticæ merentur cognominari , nullum video impedimentum , quo minus lien quoque , glandulæ renales sive ad plexum ac thyroideæ , structuræ fibrosæ sanguinisque transcolationis intuitu , cum *Ruyfchij* nunquam satis commendando , sanguinæ debeant salutari . Tum ad simplicissimam glandulæ

secer-

secernentis structuram properanti' vix aptius hæc videtur definienda , quam acutissimus *Bellinus* fecit his verbis : formari glandulam posse , si a summo ramo arteriarum , vel etiam a quacunque parte rāmorū aut trunci dederatur canaliculus non conicus , neque emittens rāmos , sed cylindricus & vel advolutus in spiram , vel plicatus in plicas , vel saltem extensus per convenientem longitudinem , atque per totum ambitum multis foraminulis pertusus &c. Qualem conformatiōnem quia præ se ferunt omnes glandulæ , quas *Ruyschij* spuriās vocare placet , veluti non nisi arteriolarum extremitatibus constantes , v. g. in cerebro , oesophago , ventriculo , intestinis , hepate , renibus , testiculis , utero &c. sequitur evidētissime , hasce glandulas , si solæ occurant , v. g. in tunicis glandulosis , omnium esse simplicissimas ac mere vasculosas , si vero sub membrana ambiente cum substantia alia folliculari aut saltem spongiosa conjungantur ac in canaliculos excretorios , modo breviores , modo longiores , abeant , glandulas magis compositas seu vasculo-vesiculares efformare , sporadicarum demum , congregatarum conglutinatarum & conglomeratōrum titulo venientes . Glandularum sporadicarum intestini re-
Etī *Peyerus* meminit , descriptio vero earum ; ad quam provocat , in *Willisio* frustra queritur , a *Ruyschij* nihilominus cum foveis sive folliculis exprimitur . Neque absimilem structuram intestino-
rum tenuium glandulis congregatis , a *Pechlino* , *Listero* & *Peyero* memoratis , laudatus *Ruyschius* vindicat , dum texturam follicula-
rem in glandulis , quæ circa labia & buccas , atque sub pa-
lato , congregantur , *Malpighius* pariter distinctius evolvit .
Conglutinatarum glandularum nomen tonsillis atque pro-
statis a *Losio* inditur , quod utræque e pluribus sim-
plicioribus ita conglutinentur , ut exteriorem superficie partem satis æqualem , interiorem vero , qua cavitatem oris vel ure-
thræ spectant , multis sinibus pertusam exhibeant . In glandulis de-
nique conglomeratis , sive secundum *Schelhammerum* congestis ,
major simplicissimarum glandularum atq; longiorum canaliculo-
rum excretiorum numerus cum substantia folliculari aut saltem

Spongiosa conglomeratur & congeritur, quam in præcedaneis.
Folliculosa ipsarum compages a *Malpighio*, spongiosa vero a *Vieus-
senio* innuitur, ac alterutra ex magnitudinis incremento, quod nota-
bile capiunt, quoties uberior flatus vel aqua in canalem earundem
excretorium vel in arterias tubuli medio impellitur, colligitur cer-
tissime. Canales vero excretoriū, per quos fluidum secretum
aliorum amandant, quia certiorem haud dubie istarum con-
stituant characterem, quam superficie inæqualitas, nihil obsta-
re videtur, quo minus hepar, renes & testiculi, ratione excre-
toriorum ductuum, æque glandulis talibus accenseantur, ac
glandulæ salivales, pancreas, cerebrum &c. quibus inæqua-
lis est superficies. Thymus certe quainvis superficiem inæqua-
lem obtineat, ob peculiaris tamen canaliculi excretoriī defe-
ctum frustra glandulis conglomeratis annumeratur; nec poti-
ori jure glandulis congregatis accensebitur, quod vasa ejus lym-
phatica non nisi unius generis innotescant, ad duētum thora-
cicum tendentia & valvularum consuetarum expertia. Ceram
quandoquidem in humanum ductum thoracicum infusum prom-
te per notabilia lymphatica ad thymum excurrere post Clariss.
Copperum ipse tribus abhinc annis in publica cadaveris foemi-
nei dissectione vidi aliisque ostendi. Quonodo *Coppero* autem exin-
de inferre detur, thymum in foetu & junioribus subiectis, veluti
majorem, peculiare chyli constituere diverticulum!
haud in propatulo est, cum modus oppido lateat, quo chy-
lius per easdem vias, per quas ipse vel saltem lympha conti-
nuo affluit, queat remeare; adeo scilicet thymus & confor-
matiōnis & usus ratione inter omnes ambiguit glandulas. Su-
pereſt, ut fidem datam liberem, quamque varie crassiores hu-
mores a subtilioribus secerni possint, explanem: primum fi-
eri hoc poterit, si sanguis per arterolas in folliculos appensos
effundatur, effusi autem pertio tenuior per poros proportionatos
aliorum reducatur, parte crassiori relicta, prout *Satorini* pin-
guedinis separationem dilucidavit. Deinde idem obtinebitur,
si fluidum a sanguine quidem seernatur subtilius, moram ta-
men nectendo crassitatem contrahat, vel quia lympha admixta

nunc

nunc per lymphaticorum oscula absorbeatur; nunc ab aere ipso abradatur, vel quia tenuioris etiam fluidi particulæ successive invicem continentur, sique crassiores efficiantur. Postrem fortassis in bile folliculari locum habet, cum hepatici porib[us] tenuissima cernatur, in folliculo autem fellis longiore mora notabilior[em], & crassitatem, & amaritatem contrahat, nullis interim vasis lymphaticis ab ista vesicula juxta Nuckium emergentibus. A quibus econtra in mammis v. g. & testiculis lympha videtur excipi, quo lacti & spermatis virili spissior concilietur consistentia; quemadmodum ab aere in auribus, naribus, ore, trachea, &c. serum tenuius continuo diripi, crassiori magis & plus minus viscidio superstite, inter omnes constat. Sed haec circa abstrusissimam glandularum structuram & differentiam primoribus attigisse labris sufficiat occasione Disputationis Inauguralis, quam de *Cancro Mammarum*, glandulas corripiente, *Nobilissimus & Clarissimus Vir Juvenis, Dominus*

GEORGIUS FRIDERICUS Rottenberg / Lips.

Philosophiae Magister & Medicinae Baccalaureus, crastina luce B. C. D. masculine est defensurus. Hic quippe sicuti in Academia patria præceptis Philosophiae hanc leviter imbutus ex Medicina Professorum & Doctorum manuductione in Arte salutari egregie profecit, egregiosq; profectus cum in examinibus theoretico altero, altero practico, cum in lectione cursoria aliisque speciminibus Gratiissimo nostro Collegio satis comprobatos dedit, ita & ex ipso confitu disputatorio omnium applausu & suffragio dignus facile reputabitur Licentia in Medicina titulo ac honoribus, quos a Facultate Medica modeste nuper petiit atque conferendos obtinuit. Cumque ad præviam hujus & submissam denominationem

Serenissimus ac Potentissimus Dominus, DOMINUS FRIDERICUS AUGUSTUS,
Rex Poloniarum, Magnus Dux Lithuaniae, Russiae,
Prussiae, Masoviae, Samogitia, Kyoviae, Volyniae,
Podolia, Podlachia, Livonia, Smolenscia, Severia &c.

Czerni.

Czernichoviae; Dux Saxonie, Juliae, Cliviae &
Montium, Angriae & Westphaliae, S. Romani Impe-
rii Archi-Marschallus & Elector, Landgravius
Thuringiae, Marchio Misnie, & superioris inferioris
que Lusatiae, Burggravius Magdeburgi, Comes
Principalis Hennebergicus, Comes Marca, Ravens-
bergi & Barbyae, Dynasta in Ravenstein, &c. Domi-
minus meus longe Clementissimus, nomine Reverendissimi
ac Celsissimi Principis & Domini, DOMINI
MAURITII WILHELMI, Ducis Saxonie,
Juliae, Cliviae, Montium, Angriae ac Westphaliae, Po-
stulati Administratoris Episcopatus Martisbur-
gensis & Academiae hujus Cancellarii Perpetui,
Domini mei Clementissimi, Procancellarii ad hunc actum vices
clementissime mihi demandaverit, mecum constitui, Nobilissimo
Domino Candidato Dissertatione finita promeritam Licentiam Docto-
ralia in Arte Medica privilegia & jurarite adipiscendi solenniter im-
pertire, Quam vero Panegyrin solennem ut splendidiorem præ-
sentia sua, Magnificus Academiae Rector, Comites Illusterrimi, Amplissimi u-
triusq[ue] Reipublicae Proceres, ut & florentissima Nobilissimorum Studiosorum
Corona, ne graventur reddere, ea qua decet humanitate rogito,
omnem posthac occasionem cum Gratiissima Facultate Medi-
dica Nobilissimoque Domino Candidato avide arrepturus, tam
insignem benevolentiam servitiis, officiis, studiis, red-
hostiendi, P. P. Lipsiae d. 14. Novembr.
M DCCIX.

LITERIS BRANDENBURGERIANIS.

Stud. B 254.46