

5. Fossilis reperitur in iisdem locis, niger, tres ad cotem reddens colores, Trichrus, qui possit dici: sicuti Plin. l. 37. c. 10. trichrum ex Aphrica, describit nigrum, qui tres succos reddit: a radice nigrum, medio sanguineum, a summo candidum. Et hic quoq; noster ille trichrus turbinatus est, & durus.

6. Reperitur in Cheruscis, Northusiæ, Hazgerodæ, quibusdã in montibus, qui omnino formam cerebri detecti præbet, longe pulcherrimus. Cuius formã satis mirari nequeo. Et eius virtutem mirabilem in sistendo sanguinẽ ex narib. expertus sum. Plin. l. 36. c. 20. hæmatiten & schiston cognationẽ habere docet. Et hæmatiten discernere venas rubẽtes, & q; sit natura friabilis. Præterea hæmatiten & anthracitin vocari ait. Quo nomine anthraces Græci multas resdixere, vt supra docuim⁹. Facit autẽ eius 5. genera secundũ Sotacũ, p̄ter magnetẽ.

Hæmatites Plinii. 1. Æthiopicus, vtilissimus oculis, ex iis, quos vocant panchrestas. Hunc idem Plin. l. eod. c. 16. hæmatitem magnem vocat. Et reperiri eũ dicit in Æthiopia, vbi sit magnes ipse Æthiopicus. Est vero iuxta eundẽ hic sanguinei coloris. Si teratur, sanguineum & croceum reddit succum, sed tamen ferrum non attrahit, vt magnes. Et profecto est magna cognatio magnetis & hæmatitis. Ex magnete vehemẽter calore ambusto fiunt hæmatites. 2. Androdamanta, vel atrodamanta, duritia ac pondere insignis. Vnde & nomen inuenit, coloris nigri, p̄cipue in Africa inuenit^r, trahẽs ad se ferrũ, reddens succũ sanguineũ. Huic respõdet plurimũ noster hæmatites, q; reperit^r in Geuro durissimus ad cotẽ, q; est trichrus. 3. Arabicus, durus, vix reddens succũ ad cotẽ aquariã, aliquãdo croco similẽ. Huic noster respondet, q; reperitur Goslarix, & ad Hercyniã syluã. 4. Elatites, cũ crudus est. Coctus autẽ dicit^r miles. Vtilis ambustis, ad omnia vtilior rubrica. 5. Schistos, cui⁹ altera species nascit^r in Africa, S. nigrũ schiston. Quod attritum aquariis cotib. reddit ab ea partẽ, qua fuerit radix, ni-