



Nr. 52. Marmor laete cinereum, maculis nigris, in concolores venas tenues excurrentibus, et virgulis candidis divis distinctum, circa die Hobestrasse, prope Curiam Variscorum.

\*) Ad 3. pedes longum reperitur.

53. Marmor cinereum, nubeculis saturatioribus, venis ochrae colore et maculis albis guttatim adspersis distinctum, circa Curiam Variscorum.

54. Marmor hepatici coloris, maculis fulvis, lineolis fuscis et maculis luculentibus distinctum, ex montibus prope Berneck circa Baruthum.

\*) Crustae 3. pedum longae eruuntur.

\*\*) Lineolae magis minusve distantes, magnitudini Terebratularum inclusarum debentur, quare ad eundem censum pertinet cum Nr. 51. & 49.

Nr. 52. Hechtgrauer Marmor, mit schwarzen, in gleichfärbige zarte Adern auslaufenden Flecken, und darzwischen kommenden weißen Strichen, von der Hohenstrasse bey Hof.

\*) Bricht drey Schuh lang.

53. Aschgrauer gewolkter Marmor, mit gelbbraunen Adern und weißlichen Tropfen, bey Hof im Voigtlande.

54. Leberfarbener Marmor, mit rothgelben Flecken, dunklen Strichen und spielenden weißen Stellen ganz durchzogen, vom Berneckerberge bey Bayreuth.

\*) Es brechen Tafeln von drey Schuh lang.

\*\*) Die mehr oder weniger weit auseinander stehenden Striche, hängen von der Größe der Terebratuliten ab; daher auch dieser Marmor zu der Art Nr. 51. und 49. gehört.



TAB. X.