

die Mitte des Abscesses sehr weich, und ich öffnete, wenn auch der Umkreis noch ziemlich ausgebreitet hart, ja wenn noch entzündliche Spannung zugegen war, ihn ohne weitem Aufschub durch einen mälsig großen Lanzettenstich u. s. w. leerte eine ziemliche Quantität Eiter aus, ohne zu drücken, verband mit einer Wieke und Arcäusbalsam, noch ehe sich das Eiter gänzlich ausgeleert hatte, und liefs mit dem obigen Umschlag fortfahren, so lange noch etwas Entzündliches zugegen war, auch immer die Milch gehörig ausleeren. Gegen den siebenten Tag hörte die Eiterung auf, die Wunde schlofs sich vollends unter Plumaceaux und der Bedeckung der ganzen Brust mit dem grünen etwas kamphorirten Diachylon-Pflaster.

Folgsame Kranke genasen noch unter 14 Tagen vollkommen. Bei Nachlässigkeit in dem öftern Umschlagen, Erkältung, Diätfehlern, Leidenschaften u. s. w. verzögerte sich die Kur bis in die dritte Woche; am längsten brachten zwei Wöchnerinnen zu, welche das Messer scheuten. Der Abscess brach endlich freiwillig auf, aber die Wunden mußten doch erweitert werden, die völlige Heilung folgte erst in der siebenten und achten Woche, und doch war noch etwas Härte zugegen, die sich späterhin freiwillig verlor. Diefs war von acht Kranken in Zeit von zwei oder drittehalb Monaten bei fünfen der Fall. Ich kehrte mich daran nicht, liefs die Brust nicht länger bepflastern, als so lange es der offene Abscess heischte, empfahl dann blofs Schonung der Brust, und ein sonst angemessnes Verhalten, und erfuhr überall nach einigen Wochen, dafs die Knoten entweder schon völlig vergangen, oder sehr geschwunden waren. In den ersten Tagen, bis zur Öffnung des Abscesses, nahmen die Kranken ohne Unterschied und mit Nutzen Opiate. Es ist thörigt, zu fürchten, dafs man unter solchen Umständen der Entzündung in die Hände, der Eiterung entgegen arbeite. Der allgemeine Zustand kann bei örtlichen Entzündungen recht gut asthenisch seyn, und ist es laut der Erfahrung wirklich nicht selten, und will die örtliche Krankheit ihren Einflufs auf den ganzen Körper zu sehr geltend machen, findet sich im Verlauf ein bedeutender

Sturm im System der Gefäfsse, und ist dennoch, zufolge der individuellen Konstitution immer und überall Asthenie im Hinterhalte, so ist eine Verbindung zwischen Opiaten und Nitrum gar nicht ein so ganz unwirksames Mittel, und eine gar so lächerliche Mischung, als es einigen Theoristen vorkommt, läfst sich auch völlig nach Browns Ideen rechtfertigen. — Ich erinnere im Vorbeigehen, dafs mir in verschiedenen Gattungen des Wurms am Finger, nichts, gar nichts so ausgezeichnete gute Dienste gethan hat, als eine ähnliche Komposition. — Die Bemühungen der Wöchnerinnen und Hebammen, durch zertheilende Mittel, d. h. durch starke, kräftige diffusible äufserliche Reize, kamphorirte Pflaster und Salben, die Krankheit abzuhalten, waren vergeblich. In einem Falle that mir das nach Hufeland neuerdings in Vorschlag gebrachte fixe vegetabilische Alkali, nicht schleunige, aber vortreffliche Dienste. Die Krankheit war fast ganz gehoben, Härte und Spannung kaum merklich, und der Schmerz völlig hinweg. Lag es an dem schlechten Verhalten der Kranken, an der Zusammenpressung der Brust durch einen netten Anzug und der verabsäumten Milchausleerung, oder wollte sich der nicht ganz zu verkennende epidemische Genius von seinem Rechte nichts nehmen lassen; kurz, da ich in Begriff stand, den Abschiedsbesuch zu geben, mußte ich hören, dafs alles wieder rückwärts gehe. In kurzem war der Abscess gebildet, und es ging nun den gewohnten Weg. In zwei andern Fällen war das Mittel einmal gänzlich ohne Wirkung. In fünf Fällen wurde es gar nicht angewendet. Die überwiegende Neigung der Entzündung, schnell Abscesse zu bilden, die hier gleichsam epidemischer Charakter war, dem sich nicht gut widerstreben liefs, mochte dem Gebrauche, dieses übrigens gewifs schätzbaren Mittels im Wege stehn. Auch kann man die Patienten in der Privatpraxis nicht so scharf im Zaume halten, wie in Hospitälern und klinischen Häusern, kann nicht so eifrig für die stete Ausleerung der Brust, für die öftere Erneuerung des Umschlags, besorgt seyn, als es bei einem Mittel, das entzündliche Stockungen zertheilen soll, nöthig, und bei die-