

vum, Id. l. 20. c. 21. Λάπαθος. Diosc. l. c. 140. Theoph. l. h. 9. ὄξαλις & ἀνάξεις. Græc. recent. ὄξυλαπαθόν. Gal. Azederas. Hisp. Ital. Agrelle Vinette, Saliette. Gall. J. B. Sorrell. Angl. Hort. Cant. Szczaw. Pol. Syren. l. 4. c. 5. Ruggstine. Lituan. Lex. Lit. Solka, Solan, Lapusch, Reisaliza szavvi. Hung. Cal. Alhamad, Asered. Arab. Avic. Ind. Azadar. Id. ib. i.e. acetosa montana. Acetosa ab acido sapore nomen habet. λάπαθος dici solunt à λαπάθαις, ab exinanendo, quod decoctum ejus emolliat & alvum exinaniat. Refigerat & emollit. Valet contra febres & inflammatis: v. plura Lapatum.

Spec. & Differ. C. B. l. 3. f. 4. p. 114. J. B. T. 2. l. 23. c. 11. p. 989. & calior.

Acetosa pratensis. C. B. n. 1. Oxalis. vulg. I. B. Lapatum. 4. Diosc. Sylv. Plinio. Oxylapathum. Gal. Ru-

mex acetosus. Ruell. Oxalis. Matth. Lapath. acut. Ang. common sorrell. Angl. H. Cant.

— media parte candidis. fol. I. B. it. — fol. crispis, Joxalis crispa. I. B. l. c.

— montana max. C. B. n. 2. oxalis maj. Brockenb. Thal. oxal. max. I. B.

— alpina max. lonquetti. P. Amm.

— mont: geniculis nodosis. C. B. n. 3. oxal: fol. amplis genic. tuberosis. I. B.

— bulbosa. C. B. n. 4. — rad. tuberosa. C. B. n. 5. I. B. l. c.

Americana fol. longiss. pediculis donatis. C. B. n. 6. Prodr.

Indica vesicaria Eyst. v. vesicaria peregrina. P. Amm. duplex. maj. & min. C. M.

fol. calthæ peregrina. C. B. n. 7. Oxal. zarynthi Alpino. — Africana. I. B.

— rotundo horrensis. C. B. n. 8. Eadem fol. subrot. acutis. — Hispan. P. Amm.

— — Alpina. C. B. n. 9. Prodr.

scutata repens. C. B. n. 10. Prodr. oxalis fol. rot. repens. I. B. l.

Cretica sem. aculeato. C. B. n. 11. Pr. ox: min. acut. Candia. I. B. Beta spinosa. Cret. Montalb.

fol. ocymi Neapolitana. C. B. n. 12.

arvensis lanceolata. C. B. n. 13. oxal. minima. Trag. Matth. — ovina. Tab. Eyst.

— — fol. latior. Ead. angust. Ead. maj. minor: fol. C. B.

— — angustifol. repens. C. B. n. 14. Pr. oxal. parva auriculata repens. I. B.

— — minima non lanceolata. C. B. n. 15. oxal. min: 2. Tab.

— — fol. similis villosa. C. B. n. 16. Herb. Joh. Infantis Monardi. Lugd. I. B. l. c.

— — minor Grænlandica fol. & spicis rubris. Mart. stiner. Spitzberg. p. 41.

Acetosa arborea Montalb. v. oxyacantha. P. Amm.

Acetosella. v. Lapatum trifol. acetosum. Achamenis, αχαμενίς. v. polium montanum.

Achalt. Arab. v. milium Solis. Achanaca. Thev. v. Brassicæ folia peregrina. C. B. p. III.

Achanaca Indorum. J. B. T. 2. l. 21. c. 1. v. Brassica. Achaovan. Alp. J. B. v. Parthenium. — Abiat.

Vesl: P. Amm. v. Cineraria. Achar. v. arundo arbor. Achasebda. Arab. v. nasturtium.

Achafunas. Arab. Avic. v. lactucæ asininae spec. Achaley. Dan. v. aquilegia. Ache d'eauë. Gall. v. Sion.

Achillea hordea, αχιλλεα κερανη. Theoph. 3. caus. 27.

Achillea, αχιλλεα. Diosc. l. 4. c. 36. Achillea. Ital. Tab. I. 1. p. 461. Edelgarbe. Id. v. Millefolium terr.

Aliis Αχιλλεα, μητεριφορ, χλιδωνιον, Κρατερην, περικλειον, acrus sylvaticus, militaris, millefolium, αχιλλεα. — fr. Diosc. noth. Achillea ab Achille, Chironis discipulo, Inventore nomen habet Plin. l. 25. c. 5. estque millefol. minus Diosc. v. f. l. Achillea. Matth. Diosc. v. tanacetum minus album odore camphoræ. C. B. p. 132. — montana. Lugd. Tab. v. Chrysanthemum Alp. fol. abrot. multifidis. C. B. p. 134.

Achilleos, Achilleum, αχιλλεον, os. v. centaur. luteum perfoliatum. Millefol.

Achiolt. Mex. s. medicina tingendo apta. Recch. l. 3. c. 41. Piso. Bixa Oviedi. Arbor finium regund. Scalig.

Achlades. v. pyra sylv. Cretica. C. B. p. 439. Achras, αχρα. Diosc. l. 1. c. 169. v. pyra sylv.

Achven. Arab. v. matricaria. Achu. Hebr. v. gramen. Acidoton, ακιδον. v. poterium.

Acidum lapathum, acidus rumex. v. acetosa. Acilaca. Bellon. v. aria.

Acylonion, ακυλων. v. lychnis coronaria.

Acinaria marina. v. fucus folliculaceus fol. serratis. C. B. p. 365. — palustris. v. vitis Idæa pal. C. B. p. 47.

Acinos, ακινος. Diosc. l. 3. c. 50. v. Clinopodium. C. B. p. 224. J. B. T. 3. l. 28. c. 32. 34. — Manarda. Matth. fol.

Calaminth. J. B. l. c. 33. — multis Id. ib. c. 34. — pulchra spec. Id. — Anglica Clus. v. clinopod. ocimi facie alt. C. B.

Akelejen. Akeleyen. Belg. & Brab. v. aquilegia. Acnestos, ακνεστος. v. chamelea.

Ackerbacissen. Tab. l. 1. c. 374. v. crithmus arvensis. Ackerhanenfuß. Ackerhanefoet. Belg. v. ranunc. arv.

echin. — Goldblumen. Tab. l. 1. p. 455. — Kletten. Id. ib. p. 361. — Köhl. v. Lampsana.

— Lattich. Tab. l. 1. p. 570. — Peterlen. — p. 361. — Münze. Tab. l. 2. p. 68. — Scabiosen.

— l. 1. p. 552. — Schnabelkraut. — p. 135. — Straußkraut. — l. 1. p. 644. — Wurz. — v. acorus.

— Zwibeln. — l. 2. p. 321.

Acocotlis Qnauhnahvacensis & Tepoztlanensis. Recch. l. 2. c. 6. ico. H. fol. valer. fl. bellidis.

— facie ligustici. Recch. l. 2. c. 6. p. 32.

ACONITUM. Plin. l. 27. c. 3. ακονίτον. Diosc. l. 4. c. 77. 78. Theophr. hist. l. 9. c. 16. Aconito, Napello.

Ital. Cal. Contella. Hisp. Cal. Aconit. Gall. Vall. H. R. It. Tere. Cal. Wolfskraut / Gifftkraut.

Tab. l. 2. p. 286. Cal. Mæningscapkens, Wolfskruyt. Belg. Cal. Müncke. Dan. S. P. p. 93.

Woniég. Bob. Zal. ȝtymniszech. Pol. Syren. l. 5. c. 101. It. Omieg. Cal. Bisch. Arab. Av.

Alhelagel. Arab. Avic. Ind. Item Belsati. Id. ib. species Napelli.

Aconitum inter herbas venenosas numeratur, ab Aconis montibus sic dictis Plin. l. c. vel à pago olim sic dicto ut Theoph. l. c. 7. cult, in quibus locis quondam copiose crevit. Enecat feras omnes in carnibus objectum ut & scorpiones.

Ocolorum doloribus prodeit. Diosc. l. c. huic duplex est: παρθελιαγχεις, quod etiam πέμπτερον, θηλιφοῖς, μυκτήνοις vocant: & κυνοχένοις vel λυγκτήνοις alterum. Hic a. C. Bauh. plura commiser.

Spec. & Differ. C. B. p. 182. J. B. T. 3. l. 34. c. 16.

Aconitum unifol. luteum bulbosum. C. B. n. 1. p. 383. Ranunc: cum flore in medio fol. rad. tuber. I. B. T. 3.