

ANDROSACE. Plin. l. 26. c. 4. ἀνδρόσακης. Diosc. l. 3. c. 150. *Androsace.* Ital. Matth. p. 463. *Manso-*
harnisch. Germ. Tab. l. 2. p. 491. *Χασά στάλνα.* Pol. Syrenn. l. 3. c. 84.
Androsaces vel Hydroscaces, alijs *Picas πικας*, λεύκη leuce, *γιλασία*, quia hydroscopis confert, dicitur, & el quis in
aquis crescit Plin. l. c. Herba est alba tenuibus cirris sine folio, folliculum habens in cacumine, nascitur in Syria mari-
timis. *Intra hydragoga est, extra podagratis confert.* Diosc. l. c.

Spec. & Differ. C. B. l. 10. l. 4. p. 367. J. B. T. 3. l. 39. c. 57. & alior.

Androsace petrae innascens vel major. C. B. n. 7. *Musci marini genus.* Gui. * - *Chamaeconcha innascens*
vel minor. C. B. n. 2. *Umbilicus marinus.* Monspel. *Fungus marinus minimus.* Ces.
Cotyledon folios. marin. Ad. Lob. ico. circa Magalonam & Frontignanum in stagnis.
— Ang. C. B. p. 219. v. *Cuscuta maj.* * - altera. Matth. C. B. p. 251. & J. B. T. 3. l. 29. c. 107. v. *Alfine min.*
Matth. *Navelwort.* Angl. Park. Cl. 5. p. 560. * - *Bellonij.* C. B. p. 15. v. *Polygon. baccif.*
marit. min. * - *Piso in Ind.*

Androsemum, ἄνδροσαμον. Diosc. l. 3. p. 173. *Androsemum.* Ital. Matth. p. 479. *Tutsan.* Angl. Merr.
Pochybecf. Pol. Syrenn. l. 3. c. 113. *Androseman.* Arab. Matth. l. c.

Androsamon, alijs *Dyonisia*, alijs *Aseyron ab Hyperico differt.* *Bilem expurgat.* *Herba ambustis medetur.* Diosc. l. c.
— veteribus. J. B. T. 3. l. 29. c. 131. * - ejusque spec. C. B. p. 280. v. *Hypericum.* *Herba Siciliana.* P. Amm.
— campoclarense. Col. v. *Hyperic. montan.* P. Amm. * - *hirsutum.* v. *Hyperic. hirsut.* P. Amm.
— *Lon.* C. B. p. 279. v. *Hyperic. min. erect.* * - *fœtidum f. Tragodes.* Eyst. v. *Tragium.* P. Amm.
— alterum. *spulum Col.* perfoliat. & perforat. v. *Hypericum sol nummular.* vel *Aseyrum caule quadrang.*

Anduraobajamiri. Theatr. Br. p. 489. vulgo Angelin. Pis. p. 175. Marg. p. 100. *Aneciato.* v. *Anagallis.*
Ancil-inan. *Piso in Ind.* *Ancisum.* Arab. v. *Anisum.* *Αναισιδια herba.* Theophr. 7. hist. 10. que cre-
ditur eadem cum anemone esse.

ANEMONE, ANEMONA. Plin. l. 21. c. 23. ἀναιδην. Hipp. s. 5. p. 136. lin. 38. Theophr. 7. hist. 5. Diosc.
l. 2. c. 207. *Anemone.* Ital. Matth. p. 333. *Hyerva Viento.* Hipp. Tab. l. 1. p. 90. *Anemone.* Gall. Vall.
H.R. *Anemone.* Angl. Merr. *Winde floyver.* Angl. J. B. T. 3. l. 30. c. 10. p. 402. *Anemonröslein.*
Germ. Tab. l. 1. p. 90. *Anemoneooskens.* Belg. & Brab. Tab. l. c. **Matpolsty.** Bohem. Tab. l. c.
Завітка. Pol. Syrenn. l. 3. c. 136. *Kekerchen.* Ungar. Tab. l. c. *Alnahamen.* Arab. Matth. l. c.
Kuffis, Kuphis. Afris.

Anemone, Anemona, ut: Othona, Phænion, Phenion, Phœnica, Fremium. Dicitur ab *āvīus*, à vento, quod flos
vento aperiatur. Plin. l. c. *Vetus floribus Agris, ἄργεια, Cnemion, κνειον, Meconion, μεκυνον, Tragocerus, τραγοκερος.*
Terra parine, γῆς παρέων, Barbyle βαρβύλη, Osthanis, Barylion, οσθάνης, βαρύλιον, Ornitos ceraniiς, ὄρνις κερά-νιος,
Atractylis, ατρακτυλις, pythag. Cnicus sylv. κνίκης ἄργεια Magis. Chupphois, χύφφοις Afris. Orci Tunica Romanis.
Anemolia, αναιμοια. Theophr. 7. h. 10. dicitur. *Anemone omnes coronaria sunt, & oculorum oblectamenta.* Rarus ea-
rum in medicina usus. Vires apud Diosc. & Plin. l. c. habentur. Diversunt Geteres in hortenses & sylvestres. Illa-
rum major varietas, ut ex seq. spec. & differ. constant.

Spec. & Diff. C. B. l. 5. l. 2. p. 173. J. B. T. 3. l. 30. c. 10. & alior.

C. B. l. c. distinguait *Anemonas* juxta foliorum formas in latifolias & angustifolias, deinde ratione florum, in simplices
& plenos; sed quia distinctiones à coloribus florum præcipue dependent, placet primò eas distinguere juxta 6. Cardina-
les colores, prout in tride conspicui se invicem ordinè consequuntur, nempe in colorum rubrum, flavum, viridem,
caruleum, purpureo-coccineum & deniq. album.

1. *Anemon:* floribus rubris.

Anemone fl. atro-rubente amplio tenuifol. C. B. n. 13. *Rugebrunette.* Gall. Vall. H. R. * - fl. rubro saturato te-
nuif. C. B. n. 14. * - fl. dilute rubente fol. geranei rotundo. C. B. l. c. n. 4. *sub latifol.* E-
adēm fl. pleno. C. B. n. 11. * - fl. suaverubente magno, ungibus albis tenuif. C. B. n. 23.

— fl. coccineo latifolia. C. B. n. 10. *sub latifol.* Eadem fl. pleno. * - - - pleno duplo vel triplo densiore
latifol. C. B. n. 3. * - *Cardinalis dicta fl. miniato, medio puniceo.* M. Hoffm.

— *Pavo major dicta.* C. B. n. 4. * - - - - prolifera du Bry latifol. C. B. no. 5.

— — minus polyphylla latifol. C. B. n. 6. * - - major luxuriantibus solū foliis infeliciter sylvescens
& florens ratiō. Vall. H. R. * - - polyphylla fl. suaverubente latifol. Vall. H. R. *Pavo*
major à fleur pleine, couleur de chair. * - fl. coccineo magno latifolia. C. B. n. 17. *sub latif.*

— A. coccineo phœnicio latifol. C. B. n. 18. *sub latif.* * - - pallide tenuifol. C. B. n. 4. *sub tenuif.*

— — — hexaphyllo tenuifol C. B. n. 5. *sub tenuif.* * - - octophyllo tenuifol. C. B. n. 6. *sub tenuif.*

— — — magnō hexaphyllo. C. B. n. 7. *sub tenuif.* Escarlate. H. R. * - fl. coccineo sanguineo hexa-
phyll. C. B. n. 8. *sub tenuif.* Escarlate ou foncée. Vall. H. R.

— — — sanguineo coccineo hexaphyllo. C. B. n. 9. *sub tenuif.* * - - - altera. C. B. n. 10. *sub tenuif.*

— — — ex sanguineo & coccineo media. C. B. n. 11. *sub latif.* * - - sanguineo amplio hexaphyllo. C. B. n. 12.
sub latifol. * - - miniatō Orangi, venis albis distincto. Vall. H. R. *Brancionne* est tenuif.

— — — miniata diluto-colore. J. Bapt. Ferrar. * - - saturato colore. J. B. Ferrar. * - rubra. J. B. Ferrar.

— — — coccinea foliis convolutis. J. B. Ferrar. * - purpurea fl. holoserico. J. Bapt. Ferrar.

— — — fl. rubro simplici pallentibus oris. Vall. H. R. *tenuifolia.* * - - flammeo simplici & albi splendoris parti-
cipe. Vall. H. R. *Couleur de feu & blanc lustré* est tenuifol.

— — — fl. holoserico magis pullo seu foliis fusco-rubore saturatis. Vall. H. R. *Princesse de Cajette*: est tenuifol.

— — — fl. rubro obsolete foliolis atro-purpureis, medio villo concolori. Vall. H. R. *Amaranthe*: est tenuifol. Ea-
dem foliis florum majoribus, alba linea striatis, staminibus Amaranthinis, Regate *Ama-*

ranthe. * - fl. foliis & foliolis vivaci colore coccineo splendentibus & nivis albedine vir-
gatis. Regate *vulgaire.* Vall. H. R. est tenuifol. * - fl. foliis & foliolis coccineis, flore
holoserico pleno. *Icon. Passai.* Vall. H. R. *Rouge double.* tenuifol.

— — — *Forum foliis Cocco saturatiore nitentibus utrinq; contractis, tenuifol.* Vall. H. R. *Gallipolite.*

— — — fl. miniato, colore & albo varia, *tenuifol.* Vall. H. R. *Gallipolite de Toulouse.*

— — — fl. ignis fulgore ardente innocenterque flammeo pleno tenuifol. Vall. H. R. *Incarnadine d'Espagne.*

— — — fl. pleno & foliis fulgentissimo coco splendentibus, oris niveis. *tenuif.* Vall. H. R. *Orlate Romaine.*

— — — fl. pleno rutilo & argenteo, candore bicolori splendentibus oris niveis. *tenuif.* Vall. H. R. *Orlate de Flandre.*

— — — subrubens viridi umbilico. J. B. Ferrar. * - subrubicunda comam colligens. J. B. Ferrar.

— — — subrubicunda comam explicans. J. B. Ferrar. * - fl. rubicundissimo laetis lacrymis asperfo & manus ar-
denti, *tenuif.* Vall. H. R. *Larmoyée.* * - fl. pleno miniato, cacumine albescente foliolis,

par-