

- Anemone fl. purpurasc. majore nemorosa. C. B. n. 5. sub sylv. Variat. Ranunculus phragmitis purpur. verus. J. B.
 — fl. purpurasc. minore ramosa. C. B. n. 7. * - fl. pleno purpureo nemorosa. C. B. n. 9. sub sylv.
6. Anemones floribus albis.
- Anemone fl. albo maximo tenuif. *Grande blanche*. Vall. H. R. * - fl. candido amplo tenuif. C. B. n. 16. sub tenuif.
 — fl. niveo, i. e. tenuifol. C. B. n. 15. sub tenuifol. * - Cretica fl. magno amplo in Prodr. C. B. n. 17. subtenuif.
 — albicans. J. B. Ferrar. * - fl. albicante, i. e. tenuifol. C. B. n. 18. sub tenuifol.
 — fl. ex albido majore. C. B. n. 19. sub tenuif. * - fl. ex albido minore tenuif. C. B. n. 20.
 — fl. parvo albicante. C. B. n. 21. sub tenuif. * — maxima versicolor fl. pleno, latifol. C. B. n. 1.
 — alba major sylv. C. B. n. 1. * - alba min. sylv. C. B. n. 2. * - - rubro circumdata. J. B. Ferrar.
 — alba rubro umbilico como bicolori. J. B. Ferrar. * - alpina major. C. B. n. 3. sub sylv.
 — alpina alba minor sylv. C. B. n. 4. sub sylv. * - fl. pleno albo nemorosa. C. B. n. 8. sub sylv.
 — fl. candidis aut purpurasc. peregrina anemone nemorosa affinis. C. B. n. 10. sub sylv.
 — fl. simpl. emaculati candoris latif. Vall. H. R. * - - - majore albicante tenuif. Vall. H. R.
 — — — albo grysea versicolor *Souvertij* Vall. H. R. Ead. fl. phœniceo couleur de Dattes, Miniato, Orange. Puniceo. *Poneau ou de Grenade*. Igneo seu rutilo, couleur de feu. rubro. Ruge. Rubicundo seu sanguineo. *Ruge comme sang*. Rubido splendido. *Ruge lustré*. Purpureo. *Pourpre*. Atropurpureo, *pourprebrun*. Hyacinthino, *purpure ble&istre*. Dilute purpureo, *purpre clair*. Suaverubente, couleur de chair. Violaceo, violet. Dilute violaceo, *violes pâle*. Janthino dilutiore. *Gris de lœm*. Leucophæo, *gris blanc*. Argenteo, *gris argenté ou gris de perle*. Aquæo, couleur d'eau. Amethistino, *bleu tourquin morue ou d'inde*. Cæruleo, *bleu*: dilute cæruleo, *bleu pâle*. Vall. H. R.
- fl. albo circa caulem purpurasc. Vall. H. R. tenuif. * - fl. pleno fordide albo & subcæruleo colore irrorata, tenuifol. Vall. H. R. *Angelique*. * - fl. pleno albo nitidè-fordido, (*gris sale*) margine suave rubente tenuif. Vall. H. R. Albicante. * - fl. pleno pallido candore lactescente. Vall. H. R. tenuif. *blanche de laitœ*. * - fl. albo & amœno violaceo virgatis fl. duplo latifolia. Vall. H. R. *Sylvie ou Dauphin*. Eadem fol. amœno candore & suavi purpura variis. Vall. H. R.

Sequntur Spec. & Diff. secundum Casp. & Johann: Bauhinum.

- Anemone latifolia fl. simplice. C. B. p. 173.
- Anemone latifol. fol. Cyclam. vel malvæ fl. luteo. C. B. n. 1. * - - fl. flavo. Clus. J. B. T. 3. l. 30. c. 10.
 — Italica fol. latiusc. spinosis folijs 3. Clus. J. B. l. c. ico. * - Ranunculi fol. rot. C. B. phyt. 10.
 — tuberosa bulbocast. rad. Lob. * - Tragi hortensis. J. B. l. c. 11. * - Geraniifolia. I. B. l. c. p. 405.
 — latifol. fol. Geranei rotundo purpurasc. C. B. n. 2. Geranium 1. quorundam. Dalech. Lugd.
 — — — dilute purpurasc. C. B. n. 3. Ead. dilute rubens. C. B. n. 4.
 — — — fl. simpl. carneo. C. B. n. 5. * - - purpuro saturo. C. B. n. 6. * - - violaceo. C. B. n. 7.
 — — — purpuro violaceo altera. C. B. n. 8. * - - violaceo. C. B. n. 9.
 — — — violaceo saturo colore. C. B. n. 10. * - - variegato. C. B. n. 11. * - - punctato. C. B. n. 12.
 — — — carneo. C. B. n. 13. * - - fol. saniculæ. C. B. n. 14. * - - aconiti rad. ranunculi. C. B. n. 15.
 — — — fl. orangei coloris. C. B. l. c. * - - fl. coccineo. C. B. n. 16. * - - unguibus alb. 16. Clus. I. B. l. c. ico.
 — — — magno coccineo. C. B. n. 17. * - - phœniceo. C. B. n. 18.
 — — — magno sive unguibus Byzantinis, Clus. J. B. l. c. ico. * - - ex purpura dilutiore albicante. J. B. l. c. 4. Clus. * - - ad carneum colorem tendente unguibus albicant. 5. Clus. J. B. l. c. & Casp. B. in phyt. * - - purpurei ferè coloris unguib. albic. Byzantina. 6. Clus. J. B. l. c. ico. * - - saturatius ex purp. rubens oris coccineis ungu. albic. magnis Byzant. 7. Clus. J. B. l. c. * - - purp. saturè ungu. albis magnis, infima parte purp. 8. Clus. J. B. l. c. * - - ex purp. violaceo ad umbilicum albicante orbic. 9. Clus. J. B. l. c. * - - violac. maculis albis. 10. Clus. J. B. l. c.
 — — — violac. ungu. albis magnis Byzant. 11. Clus. J. B. l. c. * - - ungu. argenteis. 12. Clus. J. B. l. c.
 — — — ampliore 12. foliis violac. purpur. unguibus albis. 13. Clus. J. B. l. c.
 — — — veluti carneo ungu. albis. 14. Clus. I. B. l. c. * - - colore orengens dicto. 15. Clus. J. B. l. c.
 — alba magna per annum florens. I. B. l. c. p. 411. ico. * - trifolia fl. albo. J. B. l. c. p. 412. ico. *Klee Wind-Röstein*. *Three leaved wind flower*. Angl. * - - cæruleo, v. Ranunculus sylv. fl. cærul. c. m. * - - alia, c. m.
- Anemone tenuifolia fl. simplice. C. B. l. c.
- geranei Ropertiani fol. cærulea. C. B. l. c. * - - fl. multifido dilute purpurasc. c. B. l. c.
 — cenantes foliis flore violaceo hexaphyllo. C. B. l. c. * - - fl. pallidè coccineo. C. B. l. c.
 — fl. coccineo hexaphyllo. C. B. l. c. * — tenuif. fl. coccineo octophyllo. C. B. l. c.
 — — magno hexaphyllo. C. B. l. c. * - - sanguineo. C. B. l. c.
 — — sanguineo & coccineo. C. B. l. c. * - - sanguineo coccineo altera. C. B. l. c.
 — ex sanguin. & coccineo medio. C. B. l. c. * - - amplo sanguineo hexaphyllo. C. B. l. c.
 — fl. amplo atro rubente. C. B. l. c. * - - rubro saturo. C. B. l. c. * - - niveo. C. B. l. c.
 — — amplo candido. C. B. l. c. * - - magno albo plurima parte anni florens. J. B. l. c. c. 26.
 — — magno albo Cretica. C. B. l. c. * - - albicante. C. B. l. c. * - - ex albido majore. C. B. l. c.
 — — ex alb. minore. C. B. l. c. * - - furvo albicante. C. B. l. c.
 — — luteo quadrifolia fol. multifido *Anguil*. I. B. l. c. * - - *Rarv*. I. B. l. c. c. 18.
 — 17. seu varia peregrina rad. fibrosa. C. B. phyt. * - tenuif. fl. luteo facie ranunculi. I. B. l. c. c. 26. ico.
 — tenuif. fl. carneo striato. C. B. l. c. * - - magno suaverubente unguibus albis. C. B. l. c.
 — — *Matth*. 1. 2. 4. 5. C. B. l. c. & I. B. l. c. c. 19. * - - varia rad. fibrosa peregrina. C. B. l. c.
- Anemone latifolia fl. pleno. C. B. l. c.
- — — maxima versicolor. C. B. l. c. * - - variegato. J. B. l. c. c. 12. ico.
 — — — coccineo. C. B. l. c. J. B. l. c. ico. * - - duplo vel triplo densiore. C. B. l. c.
 — — — Pavo major dicta. C. B. l. c. * - - coccineo sive Pavo major. J. B. l. c. ico.
 — — — Pavo major prolifera. C. B. l. c. * - - minor polyphylla. C. B. l. c.
 — — — polyphylla coccineo. I. B. l. c. p. 407. ico. * - - pleno flavo. C. B. l. c. & I. B. l. c. ico. p. 402. Clus. Eyf. * - tenuif. fl. pleno rubra. C. B. l. c. * - tenuif. fl. pleno purp. C. B. l. c.
 — — — tenuif. fl. pleno atro purpurasc. C. B. l. c. * - - fol. Geranei rotundo. C. B. l. c.
 — — — fol. Coriandri vel olivæ. J. B. l. c. c. 16. * - - multiplicato hirtato fl. quadrifolio, rubro, albo, cærul.