

Colchicum montan. fl. purp. J. B. L. c. p. 656. * - mont. minus fl. versic. J. B. L. c. * - candido flore Anglicum J. B. L. c. * - biflorum. J. B. L. c. * - minimum tenuifol. J. B. L. c.

— polyanthus fol. latis convolvulis fl. pl. purp. I. B. L. c.

Colchic: autumnale. C. B. L. c. p. 67. — comm. c. B. n. 1. Primula veris Brunf. Hermodactylus & crocus sylv. Cas. var. fol. latiore, angust. flor. dilute, saturè purp. albo, bulbo nigric. rubente Eyst.

— autumn: commune album Vall. H. R. * - - - folio lineis albis picto. Vall. H. R.

— — — intersecto luteis Vall. H. R. * - - rad. siccata alba C. B. n. 2. Hermodactylus legitimus Dod. Hermodact. offic. Lon. Tab. Colchic: minus maligne sive Hermodact. offic. J. B. L. c. * - - Anglicum candidum fol. angustis C. B. n. 3. fl. dilutiori, colore lactei candoris. + - - mont. angustifolium. C. B. n. 4. + - - pumilum fol. croci C. B. n. 5.

— — — Illyricum Ang. Lob. C. B. n. 7. + - - sive græcum non venenatum fl. luteo. I. B. L. c.

— — — & vernum simul C. B. n. 2. * - fl. versicolore J. B. L. c. p. 655. * - fl. candido I. B. L. c.

— — — autumn. fl. albis striis variegato. P. Amm.

Colchic: variegatum C. B. L. c. p. 68.

— foliis florum albis & rubri, alternatim dispositis Eyst. C. B. n. 1. + - multiflorum C. B. n. 2.

— striis albis variegatum C. B. n. 3. + - max. autumnale. Flos albus striis sanguineis maculis inæ qualibus infectus est. + - polyflorum variegat. C. B. n. 4. flos in albo pallidus, striis & maculis dilutè purpurasc. è cuius medio alias flos prolixi modo exsurgit. + - purpureo-lacteum variegat. C. B. n. 6. * - album, striis purpuro-cæruleis Eyst. + - album distinctis lineis rubris Suvert. + - fol. latis variegat. C. B. n. 5. + - ex albo & purpurasc. varium Cl. C. B. n. 7. + - ex albo & purpurasc. varium fl. pleno. Vall. H. R. * - - - fl. purpur.

magnis fol. viridibus & crispis variegatum Cornuti Vall. H. R. * - - album cum purpurasc. lineis J. B. L. c. * - fl. Fritillariae instar tessellatis C. B. n. 8. + - fl. foliis angustis &

variegat. C. B. n. 9. + - fl. pleno variegato C. B. n. 10. * - - - Jac. Cornut. I. B. L. c. fol. lat. multifl. variegat. C. B. n. 11. + - Neapolitanum Clus. vel fl. tessellatis instar fritillariae P. Amm. + - Portugalicum dictum, seu flor. striis rubris & albis varieg. M. Hoffm.

Colchic: Polyanthes simplex & plenum C. B. L. c.

— candidum multiflorum C. B. n. 1. * - - album I. B. L. c. Septenis, denis, duodenis floribus, lacteis interdum rubentibus. * - - album eleganti rubore varium. I. B. L. c.

— lato Ellebori albi fol. C. B. n. 2. + - multiplex. C. B. n. 3. Eyst. * - - fl. multipl. autumnale. I. B. L. c. * - - fl. pleno C. B. L. c. I. B. L. c. fl. albo purp. Eyst. * - - Pannonicum Poly-

anthes fl. purp. P. Amm. * - Lusitan. fl. multipl. carneo & purp. vivaci mixtum. Vall. H. R.

Colchic. luteum C. B. L. c. p. 69.

— majus C. B. n. 1. autumnale fl. multipl. Lirium alterum Theophr. Narcissus autumnalis fl. luteo Eyst. fol. angustior: latior: numerosioribus. * - - fl. melino C. B. n. 2. Narcissus Pericus Clus. Pan. hist. Cam. Tab. * - o - o similis fl. albo C. B. n. 3. Sparganium Placa Clus. hisp. & hisp. * - um - um minus C. B. n. 4. Narcissus autumnalis minor. Clus. hist.

— fl. luteo quorundam I. B. L. c. + - is affinis Narcissus Pericus. Croci flore melino I. B. L. c.

— mont. parvum luteum aliis Narcissus I. B. L. c. p. 662. * - Byzantium latifol. polyanthes I. B. L. c.

— Gallæcum minimum tenuifol. I. B. L. c. * - Syriacum & orientale zaffrano Orientale. Ital. I. B. T. 2. I. 19. c. 9. p. 679. Ico. + - striatum Cornuto. + - Amaranthinum Cornuto.

— Anglicum purpureum dupli serie foliorum in flore H. Oxon.

Alia hortulanorum quorundam nomina.

Colch: Agrippum. - bundt. - columbin. - gefüllt. - gelb. - Jan Gerritz. - Indicum sive Guineum. - purp. fl. pleno. - Persicum. - Vernum. - weiß.

Coles Cam. C. B. p. 315. v. Malva Syriaca. * - fructus duplex peregrinus. J. B. T. 1. I. 12. c. 7.

Coles Phaseolus C. B. p. 404. Colhes. Hisp. v. Brassica. Coliander. Belg. & Brab. v. Coriandrum. —

Colinia. Mal. v. Polygalæ Ind: spec. Colytea. v. Colutea. * - Theophr. C. B. p. 454. * - Lugd. C. B. p. 391. * - tertia Theophr. c. B. p. 402. v. Siliqua sylv. rotundifolia.

Collotemecatl. Mex. Recch. p. 373. Collum gruis Germ. C. B. p. 318. v. Geranium. Colmarfrau. Tab. I. 2.

p. 388. v. Anagall. Colocasia. J. B. T. 2. I. 19. c. 31. Colocasia. Plin. v. Arum Ægyptiacum P. Amm.

Colocassia, κολοκάσσια. C. B. p. 195. v. Arum maximum Ægyptiacum * - aquam ex foliis tanq: hydraulis fundens. Müntius Prof. Grön. Colchierni Bell. C. B. p. 379. v. Atractylidi & Cnico sylv. similis.

Colocyntha, κολοκύνθη. v. Cucurbita. Colocinthe Cucurbita veteribus. J. B. T. 2. I. 16. c. 1.

COLOCYNTHIS. Plin. I. 20. c. 3. κολοκύνθη. Diosc. I. 4. c. 178. Colocynthida. Hisp. & Ital. Matth. p. 615.

Coloquinte. Gall. Vall. H. R. the bitter gourde. Engl. Park. cl. 2. Coloquinte. Tab. I. 2. p. 184. Quit- apfel. Belg. Tab. I. c. Koloquintida. Bohem. Zal. Zamorskie jabłko. Pol. Syrenn. I. 5. c. 197.

Chandel Arab. Matth. I. c. Chandel in lingua Ismaëlitica J. B. p. 232. Pakkuah. Hebreis. nam a- pend Eliseum Prophetam, Regum 4! colocynthides Pakkuothsade, h. e. cucurbitæ sylvestres dicuntur.

Colocynthis, alii cucurbita sylv: ζεμβη Zoroastro; αὐτογενεῖς Ostani: Cucurbita sylvestrica Roman: Tutrastra Dacis: Vim habet purgandi, prodest nervorum resolutioni, coxendicum doloribus & colicibus, fætum necat, dentium dolores se- dat, stomacho aduersatur. Diose. I. c.

Spec. & Diff. C. B. I. 8. f. 4. p. 313. J. B. T. 2. I. 16. c. 4. p. 232. & alior.

Colocynthis fr. rotundo viridi major. C. B. n. 1. Cucurbita agrestis Brunf. + - - - flavo minor C. B. n. 2. Cu- curb. sylv. fr. rot: min: Cas. Cucurb. offic. + - oblonga C. B. n. 3. differentias sex Cordus in sua historia proponit 1. viridi cortice cucurbita, aspero fol. amara, grandis, oblong: virid: J. B. 2. maculis candidantibus. 3. Pallido luteus. 4. viride albic. 5. cui totus albus color.

— pyriformis seu Pepo amarus C. B. n. 4. — seu Cucurbita amara pyriformis variegata. J. B.

— pyriformis cortice maculato C. B. n. 5. Pseudocolocynthis Eyst. + - seu Cucurbita fol. aspero, amara gran- dis, rotunda, viridis J. B. L. c. + - seu Cucurbita fol. aspero turbinata, flava, candidantibus lineis J. B. L. c. * - - - amara, oblonga, non angulosa, colore viridi, fol. aspero J. B. L. c.

— — — amara magna fol. aspero, colore vario J. B. L. c. * - - - aspera amara, fr. parvo, globoto, vario colore J. B. L. c. * - - - amara parva mediocr: magnitudinis J. B. L. c.

— — — minima lutea amara. J. B. L. c.

Colæcia, κολοκύνθη. Theophr. I. h. 18. Colomestrum antiqu. v. Aconitum lycoctonum.