

flamme. & podagras refrigerant, aurum doloribus, cutis adustionibus prodest, alveumq; laxat Diosc. l.c.

Spec. & Diff. ferè innumerabiles sunt. C.B.I.8. f.4.p.312. J.B.T.2.l.16.c.1. & alior.

- Cucurbita maj: sessilis fl. albo C.B.n.1. var:magnitudine, cortice viridi, flavo, candido, maculoso, tuberoso, sulco-  
fo. \* - longa, fol. molli fl. albo J.B.T.2.l.16.c.1. \* - latior fol. molli fl. albo J.B.  
l.c. + - maj. rotunda fl. luteo fol. aspero C.B.n.2. varia hujus genera v. s. l. Citrullus  
maj. & Pepo maj. Sylv. \* - lutea cortice tenero J.B.l.c. \* - aspera parva, lagenam ex-  
primens J.B.l.c. — lagenaria J.B.l.c. Courage ou Calbasse. Gall. Vall. H.R.
- lagenaria fol. molli fl. albo C.B.n.3. v. variet. \* - - longa fl. albo P. Ann. + - - Indica fl. albo  
P. Ann. + - eadem maj. minor & media J.B.l.c. \* - lagenaria Americana C.B.n.4.  
Lagenulae Americanæ. \* - - oblonga fol. molli fl. albo c.b.n.5. Eadem figura falcata B.  
Vall. H.R. var. + - media inter longam & lagenariam J.B.l.c. desc. Vall. H.R.
- matracii forma Cois dicta J.B.l.c. \* - - longa fl. albo protuberante ventre J.B.l.c.
- amara parva mediocris magnitudinis J.B.l.c. \* - - minima lutea. + - - sessilis & compressa fla-  
va J.B.l.c. \* - fol. aspero oblonga, non angulosa, viridis, amara J.B.l.c. \* - amara  
magna vario colore I.B.l.c. \* - - fr. parvo vario globofo J.B.l.c. \* - seu Colocyn-  
this amara pyriformis variegata I.B.l.c. \* - humilis Mexic. v. Tlalayotl. Recch. l.6.c.35.
- mediocrocea J.B.l.c. \* - fol. aspero amaro I.B.l.c. \* - - - grandis fol: oblongis viridib: J.B.l.c.  
— fol. asp: sessilis flavescens I.B.l.c. + - - albicans I.B.l.c. \* - aspera mediae magnitud. turbina-  
ta variegati coloris I.B.l.c. \* - - minima, turbinata pallida I.B.l.c. + - - turbinata  
suberocea. I.B.l.c. \* - - Cort. molli alba magnitud. arantii I.B.l.c. \* - Ovalis ferè  
variegata parva I.B.l.c. — ovalis Park. Vall. H.R. + - aspera ovalis flavo colore I.B.  
l.c. \* - - pugillaris ex rotundo oblonga I.B.l.c. \* - Pilà palmariâ non multo ma-  
jor. rotunda. I.B.l.c. + - parvum genus fr. pugni magnitudine cortice rubro maculis  
aspero sem. rubro I.B.l.c. & C.B. \* - Capitata C.B.n.6. + - Tab. fungiformis ses-  
silis f. stellata Cam. M. Hoffm. + - fol. asperis sive Zucha fl. luteo I.B.l.c. e 10. p.110. ubi L-  
cones s. hujus cucurbitæ. \* - - fl. luted semiareus in morem intorta I.B.l.c.
- aspera fol. non fissa fr. max. albo I.B.l.c. \* - pyriformis striis distincta Park. Vall. H.R. + - - parva  
alba, J.B.l.c. \* - - luteo - viridis major M. Hoffm. \* - - albicans major M. Hoffm.
- pyrif. albicans minima M. Hoffm. + - turbinata major alba I.B.l.c. \* - ferè rotunda Park. Vall. H.R.
- aspera minima, Sphæricea, crocea variegata, J.B.l.c. + - - alba fr. longo collo. I.B.l.c. \* - Citri-  
formis Vall. H.R. + - planè Aurantii forma. C.M. \* - pomi aurantii facie  
M. Hoffm. \* - pomiformis minor alba M. Hoffm. \* - verrucosa C.B.n.7. & I.B.  
l.c. \* - - alba I.B.l.c. \* - - parva I.B.l.c. + - Clypeiformis f. Siciliana Melope-  
pon latus quibusdam I.B.l.c. + - - seu Capitata Tab. I.B.l.c. \* - - cortice molli &  
ramosa I.B.l.c. \* - - tuberosa & verrucosa I.B.l.c. + - lata Clypei-formi accedens  
non tuberosa I.B.l.c. \* - - Clypeiformi affinis ovalis angulosa ad citrum nonnihil ac-  
cedens I.B.l.c. + - - à pediculo in contum desinens I.B.l.c. \* - - utrinq; parum  
turbinata I.B.l.c. \* - genus Melopepo compressus alter Lob. I.B.l.c. Sycopépon com-  
pressus rotundus melonis effigie I.B.l.c. + - oblonga, major è viridi nigricans M. Hoffm.
- reticulata Ægyptia Charabe arir Arabum. i.e. Cucurbita bombycina Caroli Avantij Luffa Arabum Veslingi  
M. Hoffm. \* - Indica minor Tab. I.B.l.c. \* - - - minori accedens, tuberculis abun-  
dans I.B.l.c. \* - - præcoces I.B.l.c. + - a - a parva I.B.l.c. + - pepo Indicus mi-  
nor angulosus dictus Tab. I.B.l.c. \* - fructus Indicus magnitud. Ovi struthii I.B.l.c. Cu-  
curbitaceum genus cui semen spadiceum C.B.n.9. \* - - similis fr. Brasilianus C.B.n.10.
- laciniata Daleeh. Lugd.C.B.p.312.v. Melopepo Clypeiformis. \* - sylvatica aut sylv. C.B.p.313.v. Colo-  
cinthis fr. rotundo minor.

**Cucuria. Arab. v. Citri semen. Cudò. Bram. v. Arbor lactesc. Malab. Cudu-pariti, Malab. v. Alcea Ma-**

lab. Cud-vveed. Engl. v. Gnaphalium. Cuckensee. Belg. v. Pulsatilla (derivatur à Küchenischell)

**Cueyauhquilitl. Mex. Recch.p.375. Portulacæ spec. fl. rubro. Cuetlaxochitl. Mex. Recch.l.c. obsc. desc.**

**Cuguaçuremia. Bras. est Mandihoca sylv. v. s. l. Cuguaçuremiu. Bras. Th. Br. p.331. Cuha. Malabar. v. Zed-  
aria. Cù hœi. Chin. v. Aloë. Cuitlapilli. Mex. Glandularia Recch. l.7.c.44. Mercurialis spec:**

**Cù yuén. Chin. v. Radix amara tepida. Cleyer. Cujete. Br. Piso p.173. Marg. p.123. Coipouna. Bras. Piso  
H.B. p.83. alias Cupouna Cuitlacopalli. Mex. v. Copallifera 6. Cuitlacotl. Mex. montana, v. Tepacuitlacotl.  
Recch. l.5. c.17. Cuiztapacollin. Mex. seu nodus lacertæ Recch. l.7.c.29. Phaseoli spec.**

**Cù kiñ p'i. Chin. v. Arboris cortex Cleyr. Culandro. Hisp. v. Coriandrum. Culantrillo de pozzo. Hisp. v. Adi-  
antum. Culbar. Arab. v. Coriandri semen. Culb. Cult. Arab. v. Lithospermum.**

**Culcas. Arab. v. Sifer, Pastinaca tenuifol. Culcas C.B.p.196.v. Arum maximum Ægyptiacum.**

**Culices minores Lob. C.B.p.83.v. Orchis trifolia minor. Culx herba. v. Cynops. J.B.**

**Cumandatia. Bras. Piso. p.251. Cumanda-gaçu. Bras. Piso.p.251. Cumanda guiri. Bras. Piso. p.252.**

**Cumanda miri. Bras. Piso. p.252. Cumbeba. v. Jamacarústa. Cumbulù. Malab. v. Nux Malab. unctuosu.**

**Cumeis. Arab. v. Urtica. Cumenet. Arab. v. Amomum. Cumfry. Engl. v. Symphytum.**

**CUMINUM. Plin. l.19. c.8. nūμων. Diosc. l.3. c.68. Theophr. 7.h.4. it. 2. caus. 17. Cimino. Ital. Matth.**

p.399. Cominhos. Hisp. Matth. l.c. Comin. Gall. Matth. l.c. Canin. Gall. Vall. H.R. Cumin. Engl.

Park. Cl.8.p.887. Comyn. Engl. Tab. l.1. p.161. Kummel / Krahm. Gartenkummel. Germ. Tab.

l.c. Comin. Belg. & Brab. Tab. l.c. Sifot. Montbelg. J.B. Kmyñ. Bohem. Zal. Kmin. Pol. Tab.

l.c. Kminay. Lituan. Camum, Kemum. Arab. Matth. l.c.

Cuminum excalefacit, exsiccat, adstringit, ad tormina & inflationes valet. Orthopnoicis datur in posca. Serpentium morbis,  
pestium collectionibus, mensibus, abundantibus medetur; olfactum cum aceto haemorrhogiam compescit, Diosc. l.c. & Cun:sylv.

Spec. & Diff. C.B.l.4. f.6. p.146. J.B.T.3. l.27. C.15. p.21. & alior.

Cuminum sylv. sive Cyminum sativum I.B.l.c. nūμων ἄργειον. Diosc. l.3.c.69. Cimino salvatico Ital. Matth. p.399.

Wilder Kummel / Feldkummel. Germ. Tab. l.1. p.169. Wild Comyn. Belg. & Brab. Tab. l.c.

Kreicbzet. Pol. Syreny. l.2. c.16. an Carvi offic. ? Cuminum sylv. singultum ex aceto

bibitum sedat & contra affectus valet, quos satiolum tollit Diosc. l.c.

— — — primum valde odoratum globosum I.B.l.c. \* - - capitulis globosis C.B.n.3. Logo chymeni. i.e. le-

N 2 poris