

Muscus in usum medicum hodie raro venit, nisi lichenes arborum saxorumve, pro quibus muscus quandoq; sumitur, subintel-  
ligas. Est autem Muscus non perfecta planta, sed tanquam rudimentum ejus; fungo tamen perfectior, & quasi germinans, pul-  
lulans, prolificans, florens quid, si muscum juxta Græcorum Bryon exactè perpendimus. Nam βρύον, & etsi Aristot. l. 8.  
animal. muscum, item lupulum salictarium, lichenem saxatilem, gemmam populi alba, ex qua unguentum populeon fit, item  
Democrito Caucaledem teste Diosc. denotet; potior tamen significatio deduci videtur δὲ τὸ βρύον, quod est germinare, pul-  
lulare, crescere, florescere, pubescere, gignere, &c. Sic Arist. de mundo: ἡ γῆ φυτόις βρύεται τῷ ἔρωι. i.e. terra plantis & animan-  
tibus pullulans, germinans, vel (ut Budeo placet) scatens, abundans. Sic terra absolute βρύει. i.e. germinare, concipere, pro-  
creare apud Xen: dicitur: ὄσων ἢ γῆ βρύει, scilicet: τὰ φύλα (ut in Accusat. usurpat Basil.) i.e. cum terra excluderet Vegetabilia  
tang. gallina pullos; unde forsitan Germanica vox Brütten. Sic Diosc. βρύεται ἀμύλη & pubescens & florens vitis, item  
τὸ φυτόν βρύει planta pullulans, florens, germinans dicitur: licet de olea florente βρύει tantum dici Eryst. & Poll. Selint.  
Sic ἔμβρυον, & τὸ (quasi dicas ἐν τῷ τῷ γαστρὶ βρύον.) i.e. infans in utero germinans, ad sui perfectionem crescens: Sic ἔμ-  
βρυον & ἀδελφὸν prolificus, genitilis explicatur. A voce βρύει Musci deducuntur adject. βρυώδης, & ὄσων, ὄσων ἢ, it: βρυώδης, βρυ-  
ώδης, ἔμβρυον. i.e. muscosus, item mollis. sic Gal. ad Glauc. l. 1. βρυώδη σάρκα, carnes molles vocat corpora, qua facile medica-  
mentis afficiuntur: βρυώδη, musco oppleo, &c. vim tamen adstringendi, inspissandi muscum habere & thymiamatum, acopo-  
rumque compositionibus ingredi Diosc. l.c. vult.

Spec. & Diff. C.B. l. 10. f. 3. p. 360. J.B.T. 3. l. 37. c. 16. p. 563. & alior. v. etiam Lichen.

Muscus arboreus OB n. 1. p. 361. Mechstromowic. Boh. Zal. Musco de las arboles Hisp.

Muscus arboreus, usnea offic. C.B. n. 1. — villosus J.B. l.c. præstantissimus in præstantissimis arboribus cre-  
scit & albus est vel rufus. + - - capillaceus longissimus. C.B. n. 2. \* - - cum orbicu-  
lis C.B. n. 3. — pellatus & scutellaris. J.B. l.c. Muscus fœniculaceus Lugd. Muscus  
quernus Col. & in fago reperitur variat umbellis majoribus, min. planioribus ramosis.  
— ramosus. J.B. l.c. foglio di ramato Imper. \* - - barbatus. J.B. l.c. \* - - villosus heracens.  
J.B. l.c. \* - - amarus fol. absinthii J.B. \* - - sericeus J.B. l.c. + - - capitulis ca-  
cavis C.B. n. 4. \* - - coralloides C.B. n. 5. J.B. l.c. + - - nodosus C.B. n. 6. Dendro-  
bryon geniculatum Col. + - - pyxoides pilosus. J.L. + - - pulmonarius G.B. n. 7.  
Pulmonaria Trag. Lichen arboreus Tab. laciniis latioribus angust. \* - - crustæ mo-  
do adnascens C.B. n. 8. Lichen Diosc. Col. Procura Valefianorum. \* - - corpusculis fu-  
scis papillatus M. Bernh. Eph. Germ. ann. 2. obs. 5. \* - - coralloides ad maritimos à C.B.  
referuntur. + - - fœniculaceus C.B. l.c. v. Muscus arboreus 3. C.B. + - - lapidibus inna-  
scens Steinmoos Tereniabiu Arab. Avic. Ind.

Muscus maritimus C.B. l.c. p. 363. J.B.T. 3. l. 39. c. 18. 19. Ερύον θαλάσσιον. Diosc. l. 4. c. 99. Aliis ἑμάρωτος, ἑμάρωτος Gnomens-  
lon. Rom. seu mosse Angl. Park. Cl. 14. p. 1288. Althaleb. Avic. Ind.

Muscus capillaceus multifido fol. albidus. C.B. n. 1. Corallinae affinis muscus marinus tenui capillo J. B. l. c. p. 311.

— capillaceus multifidus niger C.B. n. 2. \* - capillaris. v. Trichomanes P. Amm. + - marinus tenui capil-  
lo. J.B.T. 3. l. 39. c. 56. \* - - lithopogon dictus J.L. + - - capillaceus J.L.

— ruberrimus in ventriculo marino C.M. \* - maritimus viridis multifido fol. C.B. n. 3. Palma marina  
J.B. Palmula marina Imper. hujus diversæ spec. + - maritimus tenuissimè dissectus ru-  
ber C.B. n. 4. Coralloides lenta fœniculacea J.B. l.c. Alga tinctoria Lugd. \* - pennæ si-  
milis C.B. n. 5. Penna marina Imper. J.B. l.c. \* - maritimus filicis fol. C.B. n. 6. Myro-  
phyllum pelagium Clus. + - Adianto affinis C.B. n. 7. Pennaria marina Imper. & J.B.

— adianto similis alter C.B. n. 8. Polypodium marinum Imper. \* - - gossypio similis C.B. n. 9. Gos-  
sypium, muscus Imper. + - alga bombycina dictus in Prodr. C.B. n. 10. \* - myriophyllum  
Pelagium J.B. p. 802. \* - aquaticus subterraneus J.L. + - - ceratoides J.L.

— denticulatur J.L. + - - bombycinus retiformis J.L. + - - filamentis tenuis. J.L. + - - fol.  
tenuis, cauliculis adhærentibus. J.L. \* - - pulmonarius. v. Inter Muscos arboreos.

— saxatilis C.B. p. 362. v. Lichen.

Muscus terrestris repens C.B. l. 10 f. 3. p. 360.

Muscus vulgatissimus. C.B. n. 1. — terr. & hort. l. B. l.c. + - ex cranio J.B. l.c. Usnea \* - vulgaris pennatus major  
C.B. n. 2. \* - - minor C.B. n. 3. + - pennatus maj. calliculis ramosis in summo spicatus I.L.

— pennatus minor cauliculis ramosis in summo spicatus I.L. + - pennatus testis insidens. I.L.

— filicinus major triplex C.B. n. 4. l. B. l.c. p. 765. + - filicinus minor repens. I.L. + - - minor floridus in  
Prodr. C.B. n. 5. \* - abietis facie in Prodr. C.B. n. 6. l. B. l.c. \* - bifolius procumbens  
fol. subrotundis I.L. \* - ramosus erectus oblongifolius. I.L. + - erectus fol. in orbem  
spartis. I.L. + - in udis fol. subrotundis expansis. I.L. + - cupressiformis ramosus.  
I.L. + - membranaceus pilosus. I.L. + - minor elegans clavellatus. C.M. \* - denti-  
culatus major. C.B. n. 7. — pulcher parvus repens. l. B. l.c. + - denticulatus minor. C.B.  
n. 8. — terr. Lusitanicus. l. B. l.c. + - clavato similis C.B. n. 9. + - terrestris cla-  
vatus repens. C.B. n. 10. Pied. de Lup. Gall. Seilfr. Teuffelsklauen/ Berlay/ Gürtelkr.  
Schlangenmoos. Germ. S. Janapass, Pol. Syrenn. l. 3. c. 119. Weintraut. Brunf. lycopodium i.e. pes lupi. Dod. Pes urfi. Gesn. Chamæpeuce. Gesn. Cord. Permonaria sive Pul-  
monaria. Ang. Spica celtica. Ang. Wetzemsky & Ruzet, Boh. \* - - rectus. l. B. l.c.  
p. 767. \* - - subalbidus, spinosus, catharticus, Islandicus. Ol. Borrich. in A.M.D. vol. 1.  
obs. 66. + - - ceranoides. C.M. + - - alpinus. O.M. + - - foliis cupressi.  
C.B. n. 11. Savina sylv. Trag. Chamæcyparissus Tab. Selago Plin. \* - - repens mon-  
strosus M. Bern. Eph. Germ. ann. 2. obs. 57. Herbæ musco similes. part. 3. Ind. or. C.B. n. 12  
Taucon herba apud Brasilianos. C.B. n. 13.

Muscus terr. ramosus C.B. l.c. Land Mosse Angl. Park. Cl. 14. p. 1306.

Muscus erectus ramosus saturate viridis. C.B. n. 1. Raschleber. Prussis. — terr. ramos: pulcher. l. B. l.c. p. 559.  
Selago 3. Thalii ico l. Breyn. Eph. cur. ann. 4. 5. obs. 149. Idem cum granulis inter folia C.B.

— erectus ramosus pallidus C.B. n. 2. sine claviculis. \* - terrestris candidus ramosus. C.B. n. 3. + - ra-  
mosus repens spicatus. C.B. n. 4. \* - - apicibus candicantibus. C.B. n. 5. + - ere-  
ctus major. C.B. n. 6. + - - minor C.B. n. 7. + - ramos. pulmonarius sanguineus.  
l. Breyn. Ephem. Germ. ann. 3. obs. 289. \* - ceranoides maj. & minor. C.B. n. 8. — cor-  
niculatus l. B. p. 767. \* - cupressi - formis ramosus. C.B. n. 9. — terr. foliis retrò flexis.  
l. B. l.c. \* - polytrichoides triplex in Prodr. C.B. n. 10. \* - parvus stellaris C.B. n. 11.

— in cricetis proveniens. l. B. n. 11. \* - stellaris roseus in Prodr. C.B. n. 12. l. B. l.c. + - pyxioides terre-  
stris C.B. n. 13. — pyxidialis. l. B. l.c. + - pyxioides saxatilis in Prodr. C.B. n. 14. l. B. l.c.

Mu.