

var. C.B.n.4. † - fl. miniato, sem. nigro M. Hoffm. † - fl. miniato sem. ex nigro & rubro variegato M. Hoffm. * - fl. albo sem. candido M. Hoffm. † - peruvia-
nus ruber subrotundus var. C.B.n.5. * - peregrinus ex rubro & nigro distinctus C.B.n.6.
Amacok Clus. * - peregrin. befusus duplex C.B.n.7. † - Indicus ovatus var. C.B.n.8.
— orbicularis niger Americanus C.B. n.9. Parapar. Clus.

Phaseolus Indicus Americanus vel Brasiliensis: J.B. l.c. Valloti, Jonqueti & alior.

— Brasil. foliis molli lanugine obsitis fr. magno var. C.B. n.1. Macauna Clus. * - siliqua lanugine ferru-
ginea obsita fr. ricini Jongq. † - alter fr. nigro pisi magnitudine C.B. n.2. * - vul-
gari similis sed major & elatior var. C.B. n.3. p.342. * - spadicei coloris & circa hi-
lum fusci candicantis C.B. n.4. * - minor C.B. n.5. magna hujus variet. 12. genera
Tab. & Ger. facit. Siliquula angusta, Anil. C.B. n.6. * - Brasil. cum suo lobo, faba spa-
dicei coloris & circa hilum fuscum candicantis. J.B. l.c. * - Americ. maximus lobus, fa-
ba obsoletè rubente, hilo longo albo. I.B. l.c. † - Brasil. multis, spadiceus magnus, cum
magno hilo nigro plurim. ambiente. I.B. l.c. Macauna Lob. obs. Tab. Lugd. hist. Moncouna
Th. Br. p.405. ico. † - major picturatus & alter dilutiore colore. I.B. l.c. * - ma-
gnus torus niger splendens J.B. l.c. * - i - i magni varietas cinerea & ex cinereo nigri-
cans. I.B. l.c. * - us - us siliqua decurrente lanugine obsita fr. Ricini Vall. H.R. * - vio-
laceus. J.B. l.c. * - puniceus Cornuti P. Amm. † - niger. I.B. l.c. * - i rotundi
nigri splendentes I.B. l.c. * - atroviolacei I.B. l.c. * - fusci fol. crassis & pinguibus
I.B. l.c. * - tumidi, minores nivei I.B. l.c. * - us albus minor oviformis seu Veneris
M. Hoffm. * - scandens O.M. † - lactescens tuberosus. v. Apios Americana Cornuti
P. Amm. † - vulg. Italicus humilis albus cum orbita rubente vel nigricat. I.B. l.c. † - ni-
veus minor circa hilum nigra macula insignitus. I.B. l.c. * - i patvi albi cum orbita mi-
nima rubente I.B. l.c. * - - - magna rubente I.B. l.c. * - - pallido albi ex A-
merica delati Lob. I.B. l.c. * - - Italis niger cum macul. alb. I.B. l.c. * - ex Guinea
Paludano, spadicei col. min. I.B. l.c. † - nigricans hysto prominente I.B. l.c. † - lata sili-
qua fr. exiguo nigro, umbilico candido. I.B. l.c. * - lata siliqua v. Faba Aegyptica fol. albo
P. Amm. * - seu Smilax hort. anagyridi similis ferè, colore rubescente I.B. l.c. † - In-
dicus parvus maculatus I.B. l.c. * - Indic. parvus rubens hilo nigro I.B. l.c. * - Indic.
ex rubro spadiceus splend. I.B. l.c. * - i rubentes figura penè nostratum cum linea elata.
I.B. l.c. * - i Africani parvi nonnihil albicantes. I.B. l.c. † - Laburni fr. ex nigro subvi-
resc. Aegyptius fl. luteo I.B. l.c. * - nigri, facie seminis pæoniae splendentes, umbilico
albicante: & alter Aegypt. min. I.B. l.c. * - parvi ex America Lob. ex fusco purpurasc.
I.B. l.c. * - ex Angola Paludano pallidi var. I.B. l.c.
Pisum Americanum coccineum aliis Abrus & idem nigrum I.B. l.c. * - - majus
compressi: macul. & non maculatum I.B. l.c. * - - aliud magnum bicolor coccineum
& nigrum seu phaseolus bicolor Anacok dictus I.B. l.c. * - - aliud magnum bicolor,
Anacok accedens. phaseolus totus ruber. I.B. l.c. Phaseolus Ind. rubri duris. Lob. cum
nigra macula & alter. genus sine macula & cum longa tenui macula I.B. l.c. Koeni-
meni Batavis Indorum. Cleyer ad C.M. * - us seu Pisum Indicum compressi: fan-
guineum Lupini facie I.B. l.c. † - sanguineus ovatus Indicus J.B. l.c. † - niger ovatus
Indicus I.B. l.c. * - fulvus ovatus Indicus I.B. l.c. † - lato striato sive radiato sem. alter
punctatus capsula atro - virente I.B. l.c. * - orum Indicorum latorum tres spec. & Clusii
latus I.B. l.c. * - us novi orbis latus, totus candidus off. simil. I.B. l.c. * - latus albus
ex nigro varius, angustifol. I.B. l.c. † - i lati candicantes virgulis nigricantibus notati
secundum longitudinem vel nigricantes fl. albo I.B. l.c. * - - magni toti albi excep-
tis quibusdam radiis I.B. l.c. * - - prorsus nigri I.B. l.c. * - - coloris tegularum
cum striis per medum nigris, I.B. l.c. Phaseolus Capotillo del Aldana spadice colore.
I.B. l.c. * - novi orbis ex atro purpureus aut spadiceus compressus duum generum,
I.B. l.c. † - i rubri Americani striati plani I.B. l.c. † - us sanguineus compressus umbili-
co albo. I.B. l.c. * - vulgari minor & planior sub rubro colore fol. angustis. I.B. l.c.
— Lablab. Alpini I.B. l.c. v. Phas. Aegypt. * - Lablab. niger & spadiceus hilo lon-
go & albo I.B. l.c. * - peregrinus orbicularis cinerei coloris tectus atrâ tenuique mem-
brana I.B. l.c. * - - angustus nigricans, alba tenui membrana tectus I.B. l.c. † - ni-
gitarum colore fusco I.B. l.c. Lobus cartilagineus ex Insula Mauritii faba nigra I.B. l.c.
Lobus peregrin: cartilagineus, phaseolo ex puniceo nigro tanquam annulo cincto. I.B. l.c.
Phaseolus 2dus Nigritar: non magnus I.B. l.c. * - peregrin magnus coloris castaneæ
cum magno hilo lævis I.B. l.c. † - Indicus magnus ruber splendens I.B. l.c. * - Indic:
magnus colore ex phœniceo cœceo. I.B. l.c. † - arborescens ex Guinea Paludano latissi-
mus ferè quadratus I.B. l.c. † - i arborescens longiss. lobis: phaseoli lati plane spadicei.
I.B. l.c. * - us arborescens minor planus rugosus spadicei coloris nervo eminentiore.
I.B. l.c. * - - phaseolo seu faba plana, longa, nigra I.B. l.c. † - - similis ovo columb.
ex albid. I.B. l.c. † - - seu phaseolus niger ad ovum columb. accedens. I.B. l.c. † - novi
orbis faba purgatrix latis. I.B. l.c. * - novi orbis seu fabæ purgatricis latis. varietas
longior. I.B. l.c. * - Macouna similis I.B. l.c. † - Indicus brevi siliqua tumidaque & ni-
gra I.B. l.c. Lobus quadrangularis I.B. l.c. Lobus membranaceus planus niger I.B. l.c. pha-
scoli novum genus fol. lentisci I.B. l.c. * - us vulgar. Lob. icon. variat. plures rat. color. fig.
magnitud. I.B. l.c. † - fr. & fl. subcinerico Vall. H.R. * - minimus fr. viridi ovato. Vall.
H.R. * - fl. puniceo Cornuti Vall. H.R. id: fr. variegato Vall. H.R. * - peregrinus albi-
cans, rarus forma variegata Vall. H.R. † - Guinensis lato fr. argent. lineis nigris striato.
Vall. H.R. † - Canadensis minimus siliquam terra condens Arachidna Canadensis minima
quibusdam Vall. H.R. * - minor Colossinus siliquis longissimis Moris. † - siliquis
rotundis vicæ fr. ovali viridi Moris. * - Africanus Cam. C.B. p.340. v. phaseolus pere-
grinus hortensi affinis. † - Nigritarum. v. phaseolus Guinensis lobo cortice nigro te-
cto. † - peregrinus Clus. C.B. p.338. v. Faba Indica prælonga. * - peregrinus Belli.
C.B. p.351. v. Astragalus Boëticus lanuginosus rad. amplissima. † - Peruanus C.B. p.338.
v. Faba Indica purgatrix. † - sativus Dod. C.B. p.338. v. Faba. † - sylv. Dod. C.B. p.338.
v. Faba sylv. fr. rotundo atro. * - sylv. Lugd. C.B. p.343. v. pisum sylv. perenne. * - Thrci-