

*Polygonatum Gracis à crebris geniculis in radice dicitur: Sigillum Salomonis, Geniculata, Genicella alia.*

*Spec. & Diff. C.B. l.s. f.2.p. 313. J.B. T.3.l.31. c.17. 18. & alior.*

*Polygonatum latifol: vulgare C.B. n.1. — vulgo Sigillum Salamonis Brunf. I.B. l.c. Frassinella Ang. Cef. Seca-  
cul quorundam male. \* - majus vulgari simile I.B. l.c. + - latifol. maximum. C.B.  
n.2. + - ellebori albi foliis C.B. n.3. J.B. l.c. \* - - fl. pleno Th. Barth. in A.M.D.  
Vol. 2. obs. 130. \* - - fl. duplice odore Vall. H.R. \* - - fl. majore odore C.B. n.4.  
— fl. ex singularibus pediculis. J.B. l.c. + - latif. minus fl. odoro. C.B. n.5. in Prodr. \* - - perfoliatum  
Brasilianum 2. Prodr. C.B. n.6. J.B. l.c. \* - - ramosum C.B. n.7. J.B. l.c. Laurus Ale-  
xandrina Matth. Hippoglossum Lugd. Rusco affinis 3tia Cef. + - angustifol: non ramo-  
sum C.B. n.8. I.B. l.c. Ephemeron quorundam. + - angustifol. ramosum C.B. n.9 p.304.  
J.B. l.c. \* - - Clusi P. Amm. + - tenuifol. trium ulnarum C.M. + - racemolum  
Cornuti Vall. H.R. app. - - fol. hederæ v. Gramen Parnassi P. Amm. + - spicatum  
fertile Cornuti Vall. H.R. + - spicat: sterile Cornuti Vall. H.R. + - ramosum fl. lutea  
majus. Cornuti Vall. H.R. \* - vet. v. Laucaanthia, polycnemon, polygonum minus.  
Jac. Cornuto.*

**POLYGONUM** plin. l.27. c.12. πολυγόνον. Diosc. l.4. c.4. & 5. *Polygono. Ital. Matth. p.486. Corriola.  
Hisp. Matth. l.c. Renouée. Gall. Vall. H.R. Knotgras. Engl. Merr. Veggras. Germ. Tab. l.2.p.503.  
Duyzendknoop. manneken. Belg. Deygras. Dan. S. Pauli. p.438. Truska wecgin. it. Anpor.  
Bob. Zal. Basialrahagi. Arab. Matth. l.c.*

*Polygoni maris & feminæ vis in succo refrigerat & spissat: Ideo ad hemoptysin, cholera, diarrheas, ulceras, ignes sacros, tu-  
mores valet. Diose. l.c. Polygonum ab interprete Sanguinaria redditur. Polygonum mas alias πολυγόνον, κυρχάλη, ηρά-  
κλεια, Ἀφαλίας, χλωρόφυλλον, κλῆμα, πολυκαρπος, κυρκίνη, θρος, πενταλίς, μυρτοπίταλον, κυαπίδιον, πηδέλιον, Thephis Stenophis.  
Ægypt. γεννος ἡρως, Genitura herois Magis στον ενος, Unquius muris, Seminalis, Stopimaca, Roman. Chulus Afris. Polygonum  
femina, Seminalis dicitur. Nomen ei quoq; apud Grecos à multis geniculis in caulinis est.*

*Spec. & Diff. C.B. l.7. f.5.p. 281. J.B. T.3.l.29. c.119. & alior.*

*Polygonum majus.*

*Polygonum latifol. fl. candido, ex purp. candic. rubente. C.B. n.1. — seu Centumnodia Brunf. I.B. l.c. Corrigio-  
la Cord. Proterpinaca Apul. Sanguinalis mas Cord. + - majus erectum angustifolium fl.  
candido. C.M. \* - - spec. variae C.M. \* - oblongo angusto folio C.B. n.2. - angu-  
stifol. J.B. l.c. duplex. \* - brevi angustoque folio C.B. n.3. \* - sexatile 1. prodr.  
C.B. n.4. \* - maritum latifol. C.B. n.5. — marinum J.B. + - marit. latifol. Dalech.  
I.B. T.1. l.4.c.16. + - angustifol. C.B. n.6. \* - montan. angust. fol. polycaulon. C.M.*

*Polygonum minus. C.B. l.c.*

*— — cocciferum (ad radicem) C.B. n.1. & Cam. ep. — Polonicum cocciferum J.B. l.c. \* - - v. Been  
rubrum Montalb. p. Amm. + - angustissimo & acuto vel gramineo folio minus repens  
C.B. n.2. Knavvel. Engl. Merr. Knavel. Trag. Polycarpon Lugd. Saxifraga Anglicæ Lob.*

*— fol. gramineo majus erectum C.B. n.3. — Dod. seu tenuifol. J.B. l.c. Anthyllis Valentina Clus. + - fol.  
gramineo altera J.L. + - majus erectum angustifol. fl. candid. March. Brand. C.M. v. ico.*

*Polygono angustissimo folio affinis C.B. n.4. Hæmorrhoidalis Aldroandi. + - um minus candicans var. C.B.  
n.5. Herba Turca montana Cef. \* - montan. vermiculatae foliis C.B. n.6. + - mont:  
minim: sericeum Ad: Lob: Vall. H.R. app. + - Creticum Thymi fol. 2. Prodr. C.B. n.7. + - lit-  
toreum minus flosculis spadiceo albicantibus 3. Prodr. C.B. n.8. + - minus tenuifol. 4.  
Prodr. C.B. n.9. + - maritum foliolis serpilli C.B. n.10. + - pusillo vermiculato  
serpilli fol. J.B. p.377. \* - minus seu Millegrana major duplex C.B. n.11. Herniaria du-  
plex glabra & chrysota I.B. l.c. Toni quett: Vall. H.R. Empetrum Trag. Epipactis Ang: Mille-  
grana Cord: Herba cancri minor Cord: Herniaria Dod: Lithontrion Herba turca Lob.  
Bruchfraut/Harnfr. tab. l.2.p.507. Pisces-urt. Dan. S. Pauli p.345. \* - minus lenti-  
folium 4. Prodr. C.B. n.12. \* - parvum fl. albo verticillato J.B. l.c. p.378. \* - fol.  
Herniarie & facie, rad. perampla I.B. l.c. — Herniarie foliis & facie perampla rad A-  
stragali Lob. Vall. H.R. \* - minimum seu millegrana minima C.B. n.13. - - vel linifolia  
per terram sparsa fl. scorpioidis. I.B. l.c. + - muscosum minimum Bocc. p.56. tab. 29.. + - ca-  
pitulis ad geniculum echinatis Bocc. p.41. tab. 20. - - Polonicum cocciferum G. Segeri E-  
phem. Germ. ann. 1. obs. 8. Herba ad rupturas utilis Monardi C. B. n.14.*

*Polygonum bacciferum seu Uva maritima C.B. l.1.f.2. p.15.*

*— — scandens C.B. n.1. Ephedra plin. seu Anabasis Bellon. & Dod. \* - - marit: majus C.B. n.2. Uva  
maritina Dod: Scropius maritimus. + - - minus C.B. n.3. Croton: Nicandri Ang: O-  
steocillon Hieroclis Lugd: Tragum Gesn. \* - caryophylli holostii fl. H. Blesensis. P.  
Amm. \* - angustissimis foliis, flosculis in foliorum alis, minus alterum Tab. Vall. H.R.*

*— femina Matth: C.B. p.15. v. Equisetum palustre brevioribus foliis Ploniū kolny. Pol. Syrenn. l.1. c. 97.  
— mas. v. Centinodia P. Amm. + - polyspermum Montalb. v. Herniaria, millegrana P. Amm. \* - hede-  
raceum Col. C.B. p.295. v. Convolvulus minor sem. triangulo it: Erysimum cereale. + - ma-  
sculum fruticosum Thal. C.B. p.284. I.B. l.c. statuit polygonum 4. fruticans angustifol.  
v. Sedum minus fruticosum. \* - Tlinii Dalech. C.B. p. 212. v. Osyris frutescens  
baccifera.*

*Polygonoides, πολυγονίδιον. v. Clematis Daphnoides. Polyidos eringium, πολυέδος ῥεγήσιον. v. Rapha-  
nus. Polyidos, πολυέδος. v. Cepa. Helleborus albus. staphysagria. Polynervos, πολυνεύρος. v. Plan-  
tago. Polynuk. Boh. v. Absinthium. Polyonymum, πολυώνυμον. v. Parietaria. Helxine.*

*Polyphyllum, πολυφύλλον. v. Medium. Polyphura. Diosc. v. Leucoium. Polypodie. Engl. Polipodio. Ital.  
v. Polypodium.*

**POLYPODIUM** pl.n. l.26.c.8. πολυπόδιον. Diosc. l.4. c.188. Hipp. f.5. p.219. l.10. Theophr. 6. h.14. Po-  
lypodio. Ital. Matth. p.624. Filipodio. Hisp. Matth. l.c. Polipode. Gall. Matth. l.c. Polypodie, Okefer-  
ne. Engl. Merr. Engelsüß/Süßfahren. Germ. Tab. l.2.p.179. Engelsöd. Dan. S. Pauli. p.119.  
Boomvaren, Eyckenvaren. Belg. Tab. l.c. Osladyc. Boh. Tab. l.c. paprotka. Pol. Syrenn. l.5. c.206.  
Beffaigi, Aibeig. Maurit. Matth. l.c. Desbers, Budeig. Arab. Avic. Bisbeig. Serap. Besgegi.  
Manlio.

Poly-