

Habuerunt C. Baub. & aliorum Differentia circa Tulipas à florendi tempore desumpta. Liceat insuper eas quoque juxta 6. colorum cardinalium. in Iride observabilium, seriem cum Anemonibus distinguere, in Rubras, Flavas, Virides, Cæruleas, Purpureas & Albas. Notandum, quod, ubi in tanta colorum mixtura, que in tulipis observatur, excellentis pictura artificium deficit, tuliparum Descriptoribus in posterum sequentia erunt consideranda. 1. colores 6. citati simplices per florum substantiam spectabiles. 2. Origines foliorum florum sive Ungues cum suis staminibus & Apicibus. 3. Punctula & Lineola in florum foliis varie coloratae. Puncta sunt vel minima vel majora: illa roris minutissimi foliis aspersi faciem habent: hac magnitudine & figurâ discernuntur & nomine Macularum veniunt. Lineola, cujuscumq; coloris, sunt vel recta vel curva. Haec variè incurvantur: plurimum flamme aut serpentis instar, unde flammula, virgula, radu, stris, litura vocantur. Hac circa Tulipas requisita si Descriptor observaverit, & sibi ipsi & Lectori, mea sentia, clariorem distinctionum lucem afferet. Nam & naturam tuliparum, color unguis & staminis prodere videtur. Si enim unguis foliorum floris & stamina cum suis apicibus sunt lutea, color per totum florem diffusus luteus quoq; aut albus est; si vero unguis carulescant vel nigrivent & stamina sint atro-purpurea, color tulipa cardinalis, vel qui basi loco est ruber aut purpureus cæruleus sive invenietur sive tulipa sit multiplex sive simplex.

*Tulipa rubra vel coccinea. C. B. Anemone, Limonia theophr. Gesn. Lilionarcissus saugineus. Ad. Lob.*

*Tulipa præcox rubra colore dilutiore. \* - - - obsoleto. \* - - - in album luteum languesc. Eyst.*

*- - - - unguibus luteis. \* - - - fuligine aspersis. \* - - - maculâ nigrâ præditis.*

*- - - - odore mali aurei. \* - - - pap. errat. t - - - magnis oris ut aurum splendentibus, unguib. magnis luteis, apicibus nigris. \* eadem apicibus purpureis. \* - - - cuius flororum exteriorum ora foris lutea, interius dilutius rubentia, unguib. luteis. t - - - dilutio minii colore, interius minii, unguib. flavis magnis, apicibus cineraceis, pediculis luteis. - - - - fol. exterior. medio dorso luteis, virgulis sanguineis, orisque luteis: interiora rubent, sed in aureas oras radiatum desinunt: unguis lutei, apies nigri.*

*Tulipa præcox rosea variegata polyanthos. C.B. Eyst.*

*- - - - venis luteis. Eyst. \* - miniata, linea viridi. Id. \* - fl. reflexis, interius miniatis, herbaceis, margine ex cinnabrio rubente. Id.*

*Tulipa serotina rubra. Tulipe Tardive. Gall. H.R.*

*- - - - oris albescientibus. \* - - - colore cinnabri globosa. \* - - - coccinea holoferica. J. B.*

*- - - - rubra saturatior nigricans. \* - - - dilutior. t - - - ung. flavo-nigr. maculâ nigrâ.*

*- - - - apicibus flavis, nigris & macul. nigr. \* - - - nigris, cinereis. \* - - - versicolor, parte mediâ signaturis viridibus, alterâ verò rubrâ.*

*- - - - ramosa fl. rubr. \* - - - minato pleno. Eystet.*

*- - - - dubia, media & maj. fol. mucron. dilutè cinnabri coloris. \* - - - ex rubro & flavo, fol. 6. magnis mucronatis constans, ung. nigris, venis rubris per folia radiatum excurrentibus.*

*- - - - Pumilio latifol. rubra. \* - - - rubra C. B. Clus. hist. Lob. Ad. p. 2. \* - - - bombycea Cretica fl. rubro*

*Suvert & du Bry. \* - - - varia Persica, fol. interius albis, exter. rubris per oras albicans,*

*unguib. nigrâ maculâ, staminibus violaceis. C. B. Suvert du Bry. Eyst. de Perse. Gall.*

*- - - - atro-rubens, striis albis, vidua dicta. M. Hoffm. La Vœe. Gall.*

*- - - - ex rubro & sulphureo variegata, unguibus pallidis, maculâ nigrâ. Id.*

*- - - - sanguine rubea Ristwifer dicta. Id. \* - quadricolor, rubr. purp. alba, striis rubr. unguib. cæruleis. Feldhenne.*

*Tulipa lutea præcox. C.B. Lilionarc. luteus Lob. Flava præcox. Clus. hist.*

*- - - - unguib. aureis. t - - - tanq. fuligine aspersis. t - - - pallidior. t - - - odore cerei, croci. \* - - - inodora. \* - - - fimbriis rubris. M. Hoff. \* - - - centifolia.*

*Le mon jaune double. Vall. H.R.*

*Tulipa lut. præcox varia. C.B.*

*- - - - extrinsecus per oras rubris virgulis leviter distinctis. t - - - circa medium radiis rubris, interius unguib. aureis stamin. pallidis. \* - - - coccinea rubentibus oris. Lob.*

*- - - - præcox angustifol. fol. 3. luteis & 3. albis. \* - - - oris rubentibus striatis, carinâ subviridi.*

*- - - - maculis minutis rubris aspersis. \* - - - centifolia. \* - - - margine roseo.*

*- - - - propè calicem radio rubro. t - - - maculis rubens. \* - - - lituris miniatis.*

*- - - - odorata. t - - - inodora. \* - - - lituris aureis. \* - - - ex luteo citrini coloris, lineis dorsalibus viridibus.*

*- - - - flava ex sulphureo colore, pallescentibus litoris, propè apices roseis, flammiformibus. \* - - - pallens oris coccineis. \* - - - media inodora Lob. cuius. 9. differentiae. t - - - bulbos in foliorum alis ferens: C. B. - - - bulbifera Clus. Tab. I.B. t - - - prolifera Camer.*

*Tulipa Inten serotina. C.B. Cam.*

*- - - - cum 4. fol. in caule I. B. \* - - - dilutior. t - - - pallidior. \* - - - intensior aurum instar. \* - - - cuius foliorum oræ guttis sanguineis asperae. \* - - - unguibus ceram olentibus. \* - - - nigranticibus. \* - - - maculâ nigrâ. t - - - apicibus nigris, cineraceis, flavis, fuliginosis. \* - - - aurei coloris. Eyst. \* - - - ex rubro viridis, coccinei coloris. \* - - - globosa aureo colore punctata. \* - - - ramosa. - Ead. fl. pleno. Eyst.*

*- - - - Media major fol. mucronat: pallidis, unguib. flavis. t - - - fol. orbicular. flavis, venis rubr. t - - - med. maj. 9. diff. Clus. Pan. t - - - fl. aureo, exterius dorso flavo, oris dilutè cinnabri coloris, unguib. flavis magnis, apicib. nigris. t - - - dubia maj. phœnico confusè mixta. Lob. Meridionale. Gall.*

*- - - - Dubia media alt. oris luteis. C. B. Clus. hist. \* - - - sulphurea fol. mucronatis. t - - - unguib. nigris. 6. 8. 12. 16. quandoque foliolis florum constans. t - - - lituris miniatis.*

*- - - - vel Sulphurea oris rubris. t - - - media altera C. B. particulis sanguineis puniceis, odore croci vel Narcissi. \* - - - colore ochræ.*

*- - - - pumilio latifol. unguib. luteo-alb. C. B. Eyst. t - - - sulphur. Eyst. \* - - - verna ramosa.*

*- - - - latifol. & angustif. \* - - - graminif. C. B. t - - - Lusitan. J. B. \* - - - bombycinæ Ferr.*

*- - - - Bizantina alt. Clus. t - - - minor Ital. C. B. Tulipe de Bologne. Vall. H. R. Lonchitis Casalp. Lilionarciss. lut. Bonon. Lob. Lugd. Eyst. \* - - - Gallica Narbonensis. Lob. Clus. Pan. \* - - - Hispanica Narbonensis. J. B. T. 2. I. 19. e. 9. p. 663. t - - - corona dicta, odorata, variegata ex luteo & miniato colore. M. Hoffm. \* - - - vel Sulphur. unguib. fuscis. Id. \* - - - fl. pleeno thyridgerula Id. t - - - centifolia. Lemon jaune double. Gall. Vall. H. R. t - - - Serotina ramosa maj. polyanthos Eyst. \* - - - min. malvæ. t - - - polyclonos Candia fol. lucido. Vall. H. R.*

*Tulipa*