

Acorus verus seu *Calamus aromaticus* radice tenera. *Jac. Breyn. Prodri. Fasc. var. plat.*
Adonis flos luteus. *Vulgaris persimilis, altior tamen. Circa Scarpenteriam in Appennini crescit.*
Agrimonia floribus squalentibus, odoratissimis. *Ibidem reperitur.*
Agrimonoides, sive *Agrimonia repens*. *Duplex major & minor. Circa Florenziolam. ad radices Appennini colligitur. Hanc ego primum intuens pro Fragnaria lutea habebam, cuius formam foliis trifoliis presentat. Videatur Fabius Colonna.*
Aguaixipuranga. *Brasil. in Theatro Rer. Natur. Brasiliae. p. 337. quoad Iconem. Ramulus est cuiusdam suffruticis: caulis in tres alias ramulos dividitur, coloris brunni, quibus insident folia tres uncias longa & unam lata, levia, non sinuosa, in acumen longum desinentia, Circæ instar. In summitate ramulorum cernuntur baccae rotundæ, subluteæ, q. 7. 12. parvis pediculis inherentes, granula fusca in superficie (fragorum instar, quibus exactè assimilantur) gerentes.*
Aguaraquiyæ. *Brasil. Ibid. pag. 303. Duplex in Theatro est Icon & quarum prima ramulum exhibet altitudinem spicatae, foliis lati, parum sinuatis, in acumen prælongum desinentibus, Solani similibus, vestitum, inter quos pediculi excrescent duas uncias longi, quibus insident baccae, to. 12. 15. partim virides tanq. immaturæ, partim rubrae per maturitatem, ad formam baccarum Ribium. Flores parvi, candidi, in racemum botrioidem congesti sunt. Altera ramulum quoq. monstrat iudeni foliis septum. Flores autem candidi, pentaphylli, singulæ pediculis duo saltu vel tres insident, quos totidem baccae virides insequuntur. Videntur ambæ esse species Capsici, bacca minoribus, ut Siliquastrum fructu rotundo, de quo Piso. p. 108. Marggr. p. 55.*
Alcea acetosa *Spinosa Indiæ Or. heptaphyllea, sive Acetosa Indica Bonitii. Jac. Breyn. Pr. Fasc. r. pl.*
*— — — fol. trifido Ind. Or. Id. ib. * - Ind. Orient. fructu lappaceo, fol. Ribes, Id. Ibid.*
— Ind. Orient. non spinosa flore amplio flavo pendulo. Cl. D. Hermans, Id. ib.
— — — moschata altera sive minor caule rubente. Id. Ibid.
— Pentaphyllæ flor. magnis odoratis. Altitudinem viri superat. Folia non sunt incisa aut serrata ad formam aliarum Alcearum, sed leviter dumtaxat sinuata. Flores albo punicei suaviter olent. Collegi in Gütlandia prope Friderichsöden.
Alimos *Lam. Herba montis Idæ in Candia, hominem fame liberans eō die, quō quis manū eam gustaverit. Le R. P. Jerosme Dandini, en son Voyage du Mont Liban.*
Aloë de Agoa, de Saldanha. *D. Wilb. ten Rhyne. Jacob. Breyn. Ibid.*
Alsine maxima *Solanifolia. Ad ripas fluminum locorumq. udorum Marchiae Brand. & aliarum Germaniae regionum, tribus quandoq. pedibus altius luxuriat. Folia habet Solani vulgaris parum sinuata, iugis similia. v. Icon. Tab. 2.*
— media, foliis Solani acutis, floribus in umbellam congestis. Altitudinem 6, vel 8. unciorum acquirit prope Fadoam in montibus Euganeis.
— minor foliis rotundis pilosis, floribus quasi umbellatis. In muris Patavinis crevit.
— spinosa, Cauliculis vere spinosis trium unciarum longitudine. Ibidem collecta.
— hederacea. Foliolis hederæ terrestris unciali tantum ibidem reperta.
— muscosa. Foliolis capillaceis musci instar, flore albo Alsines, unciali, quandoq. repens, interdum erecta, non raro crassioribus foliolis in saxi Alpium & appennini prostat.
— maritima. Quibusdam Kali putata, fol. succulentu, fl. albo. Ad littora mari Baltici undequaq.
— minor fl. ex albo puniceis. Ibidem observatur.
— palustris exigua, fol. lanceolatis, plantaginellæ aquaticæ instar, flosculis albis vix conspicuis. Hec in Marchia Brandenburg. & in Borussia in locis uidi crescit. Vid. Icon. Tab. 7.
— minima flosc. albis, fructu coriandri exiguo. Hec uncia quadrantem non superat. Foliola lentis magnitudine longa & lata. Flosculi vix conspicui. Ibidem repertur. v. Tab. 7.
Althea Indica *flosculis parvis folliculatum ramulis adfixis. D. D. Hermans. Jac. Breyn. Ibid.*
Amaranthus minor *Indicus fol. Tripolii, flor. ex æneo colore & argenteo variegatis. J. Breyn. Ibid.*
Ambaibuna. *Bras. Th. Bras. p. 257. Icon exhibet uvam viniferam nigri coloris, v. Index.*
Amygdalo Æthiopicæ similis foliis binis nervosis. *Jac. Breyn. Ibid.*
Anagallis exigua *floribus elegantissimè cœruleis buglossæ instar. In locis siccioribus Italia.*
*— fol. acutis oblongis, fl. luteis. In Appenninis * - - rotundis, fl. lut. In Sylvis Gütlandie circa Friderichsöden.*
Anchusæ *parva fol. pilosis incanis, floribus parvis instar Buglossæ. Circa Pisæ in Hetruria provenit.*
— media, floribus pallidis, rubris & variis. In Italia circa Neapolim, & in Polonia circa Cracoviæ.
Anemone *flore viridi multiplici, foliolis florum lineis albis notatis. Hic miseri videtur floris natura & foliorum, cum floris color albus ex foliolis viridibus appareat. Ita Anemone quedam folia, proxime florem caulem ambientia insigni rubore ejusdem cum flore coloris, habet. Dantur & Tulipæ, quorum folia caulem, sed proxime florem ambientia colore vel luteo vel phænicio, cum floribus suis cōmuni, pinguntur, & plura alia, Collegi quondam in Horto Medico Bononiæ, copiose ibi cultæ.*
— trifolia, foliis integris. Circa Romanam inter Appenines montes collegi,

Anthillæ