

Anthillis Italorum duplex, diversa planè à nostrate Germanorum. Circa Ferraram collegit.
Anonyma, Lampsanoides duplex. Folia habet longa tenuia, caulem pedem unum cum dimidio longe
gum circumdantia, ex cuius alis caulinis, duas tres uicias longi exsurgunt, in summitate flores
Lampsane luteos sustinentes. Altera parum latiora habet folia, priori alias per omnes partes similis.

Ex Horto Medico Patavino Anonymorum nomine quondam communicata.

Anonyma Brasilenses rideantur in Indice.

Anonis non spinosa procumbens Lusitanica flore purp. spicato. Jac. Breyn. Ibid.

Aquilegia foliis Thalictri, flosculis minutissimis albis. Alius Phlomos terre dicitur, quoniam Fumaria
speciem primum conspecta praestare videtur. Verum convenient non tantum folia & radicula; sed
etiam flores (licet exigui valde) cum Aquilegia. Crescit in Appennini locis petrosis & in Alpibus
circa Tridentum, vid. Icon. Tab. 3.

Aracaria mira. Bras. Theatr. ver. nat. Bras. p. 217. Ico. Est ramulus arboris vel suffruticis; fol. oblongis, ro-
tundis, levibus, tres uncias longis & una cum dimidio latius instar pomorum, baccas per maturita-
tem luteas tanquam jujubas ferens. Species est Ibabiraba Pis. vid. Index.

Arbor Azadirachta Indica, fol. Fraxini, sive non ramosis, fl. minore. Jac. Breyn. l.c.

— Camphorifera Japonica. Id. ib. * - Cannellifera Zeilanica. Id. ib. * - Coral. Clus. Id. ib.

Arisarum foliis longis, angustissimis, gramineis, florem succendentibus. In Insula Elba collegimus.

Artemisia rubra maritima. Folia habet succulentiora & vulgari crassiora. Humi procumbit planta.
Ad littora maris Baltici circa Insulam Finoe in magna copia crescit. Itemq; alia maritima ad

vulgarem rubram propius accedens ibidem reperitur.

Aster atticus, flore per quam cæruleo, in medio luteo, maritimus. Ibidem ad mare Balticum crescit.

Atriplex marina, non unius generis, sed plurium (& Halimus varius) eodem in loco mibi reperta.

Avicularia Africana. Jac. Breyn. Ibid.

Balsamina Indica femina fl. albo. Jac. Breyn. ib. * ---- purp. folioso. Id. * Ead. fr. Hirundi-
nis facie D. Hermans ib.

Bandura Zingalensium. D. Herm. id. ib.

Beccabunga minor fol. rotundis instar Numulariae. * Eadem major foliis acutissimis gra-
mineis. Crescunt pasim ambe in iudis Marchiae Brand. * Eadem pilulifera fol. acutis. Pilu-
llas ferr post flosculos exiguo ex albo cæruleos tanq. florum fructus. Ibidem reperitur. * Eadem
fol. per quam exiguis fl. albo. In Alpibus provenit.

Bellis caule bipedali nudo, fol. magnis latis, fl. rubris & albis. Folia instar Erysimi leviter sunt
sinuata. vid. Tab. 8. * - petraea minor. * - fol. valde exiguis caule proceri nudo, fl. albo.
Omnes haec Bellides Alpine sunt, circa Inspruk in Alpibus à me collectae. Vid. Tab. 8.

— minor caule folioso & ejus varietas. In monte Ortong circa Pataviam visa.

— prolifera vulgari similis. Circa Romam observavie eam.

— Cretica fol. spinosis. In Horto Medico Patavini crevit.

Beta maritima. In maritimis Guttlandie fol. succulentioribus & falsis provenit, humiq; procumbit.

Betonica fol. hirsutis fl. purpur. amplissimis. Hanc circa Pistojam in Appenninis collegi. Folia hu-
mida tanq. lanugine obsoeta sunt: flores laminarum instar magni ex spica emicant.

— parva fol. angustis, fl. exiguis rubris. * - fol. rotund. fl. albo. In Alpibus ambe habitant.

Birabá. Bras. Theatr. Bras. p. 151. Vid. Index. Videtur species Abate de Pannache apud Mexicanos, nisi
quod hic Strobilus cærulei coloris describatur. Biriba vero lutei coloris depingatur.

Bistorta minima spica prolifera sive foliolis ex Spica prolificis &c. Copiosa in pratis quibusdam
Appennini montis circa Scarpenteriam & in quibusdam Germaniae locis crescit.

Blitum proliferum * - maritimum procumbens. In locis maritimis Guttlandie crescit.

— monospermum Indicum aculeatum, capsula rotundata, sive Amaranthus maj. Zeilan. spi-
nosus fl. viridi. Jac. Br. Ibid.

Bojamaraca Bras. Th. Bras. p. 411. Species est Cyrtisi Bras. vid. Index.

Britannica, media inter Betonicam & Horminum sylv. Nascitur in monte Sumanò circa Vinzenzam.

Buglossum fl. candido. Crebro in March. Brandenb. sponte provenit.

— caulibus procumbentibus tenerius, fl. albis. Plantula formâ sua mentitur Anchusam arven-
sem; sed differt radice, pericarpis & aliis paribus ab Anchusa. In horto paterno Furstenwaldie &
aliis in locis March. Br. ad sepimenta prodisit. Vid. Tab. 7.

Caaacanja. Bras. Th. Bras. p. 507. vid. Index. **Caajambi**. Bras. Th. Bras. p. 485. v. Index.

Caajáraná. Bras. ibid. p. 209. v. Index. **Caaurúguacú**. Bras. ib. p. 287. v. Index.

Caapeba. Bras. ib. p. 515. 705. v. Ind. **Caimbeyebo** Bras. ib. p. 335. v. Ind.

Cajan, arbor Indica fol. Trifolii bituminosi, siliquis Orobii. Jac. Br. ib.

Calamintha spicata fol. & odore Pulegii. In locis humidis March. Br.

Calan-