

Calendula minima Hispanica. Hanc cum Kalifruente roseo ex Alicantia urbe maritima Hispania circa quam mense Novembri floruit, atrulimus & semen Clar. D. D. Mauricio Hoffmanno Alcorsum misimus. Aliimus plantulam multis annis in hortis, sed inibi altius crescendo luxuriavit.

Calceolus Marianus barbulis florum albis, luteis &c. Circa patriam civitatem crevit.

Campanula Brasiliensis. ibid. p. 329. v. Index. **Camara guacum.** ibid. p. 555. v. Index.

Cambusa Brasiliensis. ibid. p. 295. Pisoni est myrtus sylv. Icon vero in Theatro est ramus, foliis Orobii latifoliis, bacis Ribium instar racematum dependentibus partim viridibus, partim rubris.

Caoja Brasiliensis. ibid. p. 259. vid. Ind. * **Capotaya Brasiliensis.** ibid. p. 417. vid. Ind. * **Caryophyllus holosteus umbellatus.** In Alpibus.

Caryophyllus holosteus fol. gramineis acutis fl. albis. March. Brand. incola. * Ead. colore halcino. Ibid. ad fossas. vid. Tab. 7.

— palustris fol. subrotundis incanis fl. aureis. Elegans haec plantula à nemine, (quod novimus) notata in paludosis Brabantiae planiciebus (vulgô die Zehne / Felo) ad fluvium Maas circa confinia Clivie, provenit. Radix ut caryoph. Holost. serpit, folia rotunda parum acuminate, penitus incana, tanq. situ obsoleta, flos caryophyllorum holost. rotus est, nisi quod planè aureus sit, plus quam Helianthemum aliquod. Liceat hic, pacem tuam, enarrare brevibus quâ fortuna alea incidenterim in plantulam. Anno 1666. Clivis ibam eques versus Spaa & Aquisgranum acidulis nempe & Thermis usurps, unico Satellite Electorali stipatus: Dum essem in reditu, & paludosam istam instar equoru planitiem aliquot milliaribus longam per medium (Sed à vero tramite aberrans) equitarem, viaq; mihi magis magis obscurior, invia & angustissima appareret, jamq; fossâ quadam per planitiem ductâ essem præclusus, subsisto, satellitem appollo: Daniel inquam, erramus; retrocedendum. Dum respicio, satelles à via vix spithamam deflectens, equo suo ventre tenus habebat in cespitate paludoso, loco (ut ab accolis postea mibi narrabatur) immenso, neq; hastâ vel longissimâ explorabili. Hic primum agerrimè ex equo descendo, ob angustissimum tramitem, dumq; equum habenit circumducere non licet, datò blandò poppissime, caudam equi levâ, habenas dextrâ tenens (considera periculum) equum meum eodem tramite retrocedere studio, idq; bono eventu efficio. Latiior cum esset via, gladium meum terræ capulotenus infigo & equum ad gladii manubrium (nullus enim vel nimetus hic frutescit virgultum undequeq; cernitur) alligo & ad meum Danilem properans, cundem primò ex epiphysio suo traho in continens solum: deinde cum ambo nibil quidquam auxiliu quadrupedi possemus præstare, ego cultrum meum arripo, pedemq; equi alterum priorem primò à cespite circa humerum exciso liberatus extraho, & in terrâ firmiorem loco: eodem modo cum altero pedum priorum procedo. Hoc facto circa duos posteriores pedes cespitem quoq; excindo & abicio. Sic equus clamore verberibusq; incitatus semetipsum ex periculo loco juvit, & evasit. Hoc loco plantula se mibi improviso conspectus dedit, tanto sanè mibi charior, quanto periculi hujus recordatio acerbior. Videatur Icon. Tab. 7.

Canna vel Arundo tota nivea & foliis &c caule. Florentie in Horto Magni Ducis Hetruria mibi monstrata.

Capillus veneris fol. coriandri rotundis, * Idem foliis incisis & serratis. Circa Bolzanum in Alpibus.

Carlina Xeranthemoides Africana fol. A brotani feminæ. Jac. Breyen. ibid.

Centaurium minus longitudine duarum ulnarum. Circa Crostnam Silesie vicinam in locis pinguisribus.

— fl. candidis. In March. Brand. * - - fl. luteo foliis perfoliatis. * Idem fol. non perfoliatis. * Idem fol. saturati viroris, halcei aut marini coloris. Observavi passim in Italia circa Paduam, Bononiam, Florentiam, Siennam, Romam, Neapolim &c.

Centinodia maritima, procumbens, ultra tres ulnas longa, flosc. albis, in littoribus Hispanie.

Cepaea singularis. In Alpibus reperitur. Cereiotainga. Bras. ibid. p. 213. & ejus species. p. 231. v. Ind.

Cerinthe fol. & flor. tenuioribus angustis purpureo luteis. In Appenninis.

Chamaedrys Spuria, fol. durioribus, chamaedry verse ænulis, flor. umbellatis cœrul. Adiargines agrorum Italie & Germanie ad Danubium locis. * Eadem minima flosc. vix conspicuis.

Chamaerododendron exoticum fl. ampliss. liliaceis. Jac. Br. l. c.

Chamærubus March. Brand. Passim ibi in sylvis temperatoriibus: Serpende se propagat, ut Fragaris nec ultra spithamam exsurgit, acimumq; unum alterumve mori sui maturum presert.

Chrysanthemum maritimum fol. integris oblongis instar Aizoi succulentis. In Hispan. provenit.

— Africanum Erucæ vel Jaceæ fol. incanò, semine lanuginosò, Capit. Bonæ spei. J. Br. l. c.

— foliis Stœbes angustioribus. Id. ib. * Idem fol. latioribus. Ibid.

— vel potius Buphthalmum Africænum fol. Leucoi fl. cœrul. Asteris. Jac. Breyen. ibid.

— — — — fol. Leucoi fl. Asteris violaceo. Id. ibid.

— o similis Aizoides Africana maj. latifol. Id. ibid. & in cent. i. * Eadem teretifolia. Id. ibid.

— o — fol. triangulari fl. luteo. * Ead. fl. purp. * Ead. minor fl. luteo. * Ead. fl. purp. Id. ib.

Chrysanthemum