

formam calycis prestant, in quibus (quod mirum) semen durum, lentu[m] magnitudine continetur.  
vid. Tab. 6.

Funguli incarnati coloris minuti musco innati. Hos non tantum Autumni tempore, sed etiam mensa Februario in apricis locis & agris muscosis lichenosissq; in March, Brandenb, circa Rüdersdorff & alibi in pinastris casis semiputridis reperiuntur. vid. Tab. 6.

— auriculae leporis formâ, lutei. Ultra dimidiam unciam non excrescant, basi tenui innati, inter muscum in arenosis agris ibidem tempore veris & autumni proveniunt lutei coloris. Ex genere Pi-

peratorum.

**G**enista arborescens Africana fol. Styracis (olim Cyanus arboresc, &c.) Capit. Bonæ Speci.  
Jac. Breyn. l. c.

— Spartium cæruleum Africanum foliis pennatis. Id. ibid.

Geranium batrachioides fl. albo itemque fl. atro purpureo. Hec in Clarissimis Medicis Hortis passim, itemq; in Alpestribus (licet altitudine minorâ) observavi.

— fol. malvæ odoratum fl. purpur. Cap. bon. speci. ren Rhyne. Jac. Breyn. l. c.

— noctu olens Aethyopicum fol. aquilegiaz, rad. tuberosa & fol. myrrhidis latioribus. It. fol. Scandicis angustif. Jac. Br. l. c. & cent. 1.

Gramen paniculis albissimis. \* — Cristatum avenaceum aristis longissimis tortilibus. In March. Brand. montosis circa flumen Oderam. Species mihi est Geranii quæ formam seminis.

— ægylops umbellatum maximum. Quinq; ulnarum altitudine in Insula Elba illud reperi.

Guajacum Americanum I. fructu Aceris sive legitimum. \* — — — alterum fr. Euonymi.  
Jac. Breyn. l. c.

**H**Alicacabo peregrino sive capiti Monachi similis, exotica, leguminosa. Id. ibid.

Helianthemum fol. Serpilli. Circa Bononiam & in aliâ Italia locis reperi.

— saxatile, caulis & fol. incanis, oblong. fl. albissimis, Appenninum. Collegi herbulam ramam Anno 1652. mens. Mayo. cum iter susciparem botanicum Bononiæ Italie versus Pistojam, Luccam & Pisam per Appennina juga. Hoc itinere transcendus mihi erat crumes angustissimus, per summum alicuius scopuli cretacei cacumen, cui ad latus erat incisum sacellum (spelunca instar) Imaginem B. Virginii Mariæ continens, subtus fluviò vel torrente horridum ruit, qui scopulum totum ferè exederat. Locus hanc ob causam Italù appellabatur Madonna della Sasso. Cacumen Saxi hoc Helianthemum totum erat obsitum, quod vi fluminis subter ruentis brevi post fuisse collapsum, cum Bononiam redirem, mihi enarratum fuit. vid. Tab. 8.

Helleborine fl. candidis, viridibus, purpureis, versicoloribusque. Paschim in Marchia Brandenb. locis uidis crescit.

Helleborus niger fl. roseo, amplio. In Alsacia & Italia mihi innotuit. \* Idem fl. viridibus foliis atris maculis conspersis. \* Idem fl. viridi sed marginibus florum puniceis, Paeoniae instar, ut ostenderet natura affinitatem inter se. In Italia nec non in montibus Ducatus VVurtenbergensis, itemq; in Hassia reperi.

— niger foliis trifoliis spinosis. In Horto Pisano collegi. — — — ferulaceus sive Pseudo-Helleborus, caule geniculato, fl. magno instar Tulipæ. March. Br. Helleborus hic ferulaceum differt omnino ab isto ferulaceo flore Buphtalmi, quem sponte provenientem in Appenninus observavi, & sepius in clarissimis Italie hortis decerpsti. Hic enim longè per omnes partes tenerior, & humilior est nostrâ in Marchia Br. circa Francofureum copiosissime crescente. vid. Tab. 3.

Hepatica aurea quadrifolia, (alias trifolia) non raro mihi circa Bononiam &c. visa fuit.

Herba Casta Americana supina, veluti spinulis exasperata, foliolis Acaciæ latioribus, & brevioribus. Jac. Breyn. l. c. \* — vivens fol. & fl. longis pediculis unico thyrsso insidentibus Ambonica Rumphius.

Hyacinthus Africanus tuberosus fl. cæruleo umbellato. Jac. Br. l. c.

Hypaphace. Sic dictum mihi vegetabile repertum sub vicia, ejusq; radici adnatum ὑπαφάνη, sicut, ὑποκύσις, ὑποτύπη &c. In hortulo meo pensili quondam corpusculi instar fungosi ad dictam radiculam observavi. vid. Tab. 6.

Hysopus fol. acutissimis fl. purp. Frequens in Germania est. Hysopifolia Italorum. Nostrâ major est.

Hypoxyton. Sic vocavi excrementum, quod ex linguis vel asperibus Areolarum putridis mihi ad stuporem olim excrevit ultra digiti humani longitudinem, nigrum, lignosum, durum; in plures veluti digitos iterum divisum. vid. Icon. Tab. 6.

Hippoglossum fol. angustissimis, baccis ex oblongis petiolis in extremo ramulorum dependentibus. Jac. Breyn. l. c.

Holosteum maritimum fol. gramineis succulentis. Gütl. Nec variat ratione magnitudinis in maritimis Guttlandie.