

*Hermi*nium parvum fol. betonicae floscul. exiguis cætul. Hispanicum. Circa Alicandiam in Hispania quondam legi, ex cuius semine collecto postea mihi feliciter planta quotannis provenit.

Jaborandi guacu. Bras. Theat. Brasil. p. 313. 315. 317. 319. Videntur omnes piperis longi species. Jaceæ & Serratulæ affinis, capitulis Baccharidis, fol. Trachelii Zeilanicae. Sub nomine Scabiosæ Zeilanicae capitulu foliosis, sem. amaro Lumbricos necante. D. Hermanni. In H. Malab. dicitur, Gattu-Schigiram. J. Br. l. c.

Jacobæa montana maxima, fol. integris incanis sex pedes superans. In montibus circa Pisas & in horto ipso Medico Pisano decerpsti quondam herbam. * — alia fol. integris saturatè virentibus.

In horto meo Potsdamensi per aliquot annos sponte crevit 3. 4. pedes alta. Tandiporana Bras. in Th. Bras. p. 165. est fructus Japorandibæ. ibid. p. 163.

Juruparicaraba Bras. in Th. Br. p. 387. fructus. vid. Index.

Jasminum Hispanicum flore proliquo, i. e. uno ex alio flore enascente. Sapienti vidi in horto Electorali Potsdameri.

Ibapeba Bras. Theat. Brasil. p. 435. vid. Index. Icipicica Bras. Ibid. p. 451. Cucurbitæ genus. v. Ind.

Jeruminatæ. Bras. ibid. p. 453. Est melo striatus. Iaimbo. Bras. ib. p. 211. vid. Index.

Inambiguach quiya. Bras. ibid. p. 289. Spec. Berberis. vid. Ind.

Inianboy Bras. frutex spinosus, platylobis echinoidib. fol. glycyrr. Jac. Br. l. c.

Joaimbo. Bras. ibid. p. 159. Aranty parvi spec. v. Ind. Ipetotaira. ibid. p. 291. v. Inambiguach.

Jaspita. Bras. ib. p. 429. H. mimosæ spec. v. Ind. Ivatis. Bras. ib. p. 325. Melanzane spec. v. Index.

KAli fruticescens Hispanicum fol. rosmarinii, fl. roseis membranaceis. Hoc collegi in littoris Hispanie propè Alicandiam. Descriptionem v. apud Cl. D. D. Zornium in Herbario suo Pancop. — fol. crassulæ minoris. In iisdem littoribus provenit. — ex Insula Lyo. peculiare est Kaly &c.

LAburnum spinosum Mauritanicum, fol. glycyrrh. fl. albo. Jac. Br. l. c. * — majus fol. variegatis. Ibid.

— Zeilanicum fl. ex rubro & luteo variegatis, siliquis bullatis, nomine Cyrtis Zeilan. D. Herm. Jac. Breyn. l. c.

Laserpitium Daucoides Prutenicum sem. viscos. Id. & in Cent. 1.

Lamium perfoliatum fol. durioribus. Ad septimenta in Germania paucim. * — unciale. In montibus

Lathyrus Zeilanicus fl. pulchro rubro, siliquis pisi. Jac. Breyn. l. c. * — Syriacus minimus, siliquis viciæ. Id. ibid.

Laurus Indica Aldini. Id. ibid. * — seu Americana Ferrarii, Id.

— o serrata odorata Staphelianæ similis, inodora. Cap. bonæ Spei. Id. ibid.

Leucoium unciale maritimum fl. purp. Hujus foliola oblonga, incana leviter serrata. In littoribus Hispan. crescit.

— Hispanicum fol. latis Rapistri perfoliatis, fl. purp. Ibidem ultra pedem longam provenit. v. Tab. 18.

Lychnis parva palustris fol. acutis lanceolatis flosc. purp. March. Brand. Hæc uncialis, quandoq; duarum raro trium aut 4 unciarum alta. In udu circa oppidum Marchiae Bescovia & in aliis Silesiae & Crostæ locis reperitur, vid. Tab. 7.

— Sylv. Sesamoides major fl. obsoletè viridi. Hæc in arenosis, parum graminosis locis circa Patriam Fürstenwaldiam & in aliis Marchiae locis observatur. Cum floret, caulis interdum duas vel tres spithamas longus est. Foliola humi in orbem sparsa sunt. Flores in summo caulis lychnidum sunt, colore obscure viridi, Hesperidum instar violar. Semen minimu in pericarpis oblongis caryophyllorum continetur. vid. Tab. 1. * — minor fl. musculo luteo-herbaceo. March. brand. Hæc licet & Clus. & Tabern. aliisq; sit descripta; differt tamen ab illa, quod hæc major sit & flosculi viridiores. In locis iisdem, quibus crescit prior, vid. Tab. 1. & 2.

Ligustrum fol. auratis. Jac. breyn. l. c. * — argentatis. Id. ibid.

Lilium convallium ad radicem monanthemum. Nihil à communi differt, nisi quod præter usitatos flores unicum insuper florem juxta terram è radice pullulantem ostendat. Crebro reperitur circa patram Fürstenwaldiam in quereto, quod stagno Dehm disto adjacet.

Limonium echoïdes bononiense. * — unciale. Ibidem in montibus & circa Padoam.

Linaria maritimæ flor. luteis, rubris, purpur. Ad litora maris Insulae Elbae, Adriatici, & Hispanie & aliis in locis observavi. Folia sunt succulenta, breviora, crassiora vulgari, plurimi trifolia, cau-lem ambiant.

Linocarpus fol. acutis. Circa bononiam in montibus, ibi fol. rotundis, graminis holostei facie, aliisq; differentiis observatur.

Linum fol. myrthi, aliudque fol. juniperi, flore recente albó, effætō cæruleo. Bononiensem

montium quoq; est incola.

Lysimachia