

Lysimachia lutea triphylla. In locis uidis & umbrosis (quandoq; apicis, paludosis) Germaniae &c.
Lithospermum umbelliferum. In montosis circa Neapolim, Siennam, Romamq;
Lonchitis aspera major & minor. Hec à Botanicis inter saxa in locis humidioribus reperi & describitur.
Illa vero fossas amat madidas Germaniae, quæ Septentrionem spectant. Circa Cliviam &c. frequens.
Lunaria botrioides foliis Rutaceis, Fumariæ, aliisque minutim & variè incisis. Per Germaniam
in locis apicis, graminosis, etiam arenosis quandoq; provenit.
Lupinus major villosus, flor. incarnatis. Casp. baub. In Italia passim &c.

M Alva vulgar. fol. in medio maculâ atro-puniceâ insignis. Item fol. Cannabis passim in Germania.

Medica eodem modò fol. maculatis. It. fol. tetraphyllis, pentaphyllis, flor. vix conspicuis.
Et aliae earum differentie circa Bononiam Italie crebro mihi in conspectum venere.

Millefolium comâ vel umbellâ aureâ. In Istriæ partibus & circa Ravennam Italie urbem.
— incanum Creticum. Ex Horto Patavino habuimus.

Millegrana minima. Hec et si per se herbula sit pusilla; minima tamen omnium in Borussia provenit.
— latifolia. In aliquibus Marchia brand. locis.

Mimosæ non spinosæ Zelianicæ similis, fol. angustioribus. Jac. Brey. l.c.

Myrobalano Emblicæ affinis, fol. securidacæ. Jac. Br. l.c. (Nili Camaram in B. Malab. Nellicazan.)
monorchis ophioglossoides unifolia. Eadem cum altero foliolo radici adnato. Hec ex radicu-

la bulbosa, globosa, parva, caulinulum protrudit tenuem, uncias tres, plus minusve longum, cui ad-
hæret folium unicum, uncias duas longum & unam cum dimidia latum, Ophioglossi folio persimile.

Cauliculus in spicam florum definit, foliolis florum minutissimis, capillaceis, figuram (si per micro-
scopium florem intuearis) Orchidum exactè presentantibus, coloris herbacei. Spica hæc cum suo
folio adnato eminus intruenti Ophioglossum mentitur. In uidis & paludosis Borussie, circa pagum

Schreitlaken in ditione Samlandie Mense Augusto: Item circa Gedanum Urbem, reperta. v. Tab. 5.

— bifolia fl. viridibus moschum olentibus. Hæc unico radicis testiculo caule exsurgit bisunciali,
quem inferius duo investiunt foliola, unciam excedentia, striata & in rotunditatem acuminata.

Superius eminent flosculi orchidum virides, odorem moschi suaviter spirantes. In Alpibus inter Tre-

visanum & Insprug secus vias in scopulis nemorosis & umbrosis. Hujus generis alias se-
pe offendi species, fl. luteis, priori similes, suaveolentes; citra tamen moschi odorem v.

Tab. 8.

— fl. pallidè virentibus foliis priori similibus. In Borussia nemorosa & umbrosa amat loca.

v. Tab. 5.

— fol. pluribus angustis, fl. luteis ceram olentibus. Copiosa circa Berolinum sedem Electoralem
Brandenb. in pratis. v. Tab. 5.

Murimbæ Bras. Th. Bras. p. 15. Aloës Species ad Caraguatas referenda.

Muscotellina Cordi, rad. dentariae. Clavis & alibi passim.

Muscus ruberrimus marinus. In littoribus Livornæ in Tetruria & in insula Elba ventriculo-marino

innatus mihi fuit observatus.

— minor elegans clavellatus. In Alpibus. * — terrestris clavatus Ceranoides & ejus varie-
tas. In Marchia Brandenb. circa foessam Friderico-Vilbelmianam, que per aliquor millaria flosculos

Oderam & Spream conjungit, à me repertus fuit, claviculus ejus ramosus instar Cervi cornuum.

N Huat's unana. Bras. Th. Br. p. 399. v. Index.

Nigella flore magno Montis Ruah. Hec pedem longa, flore pallidè caruleo, roseo instar pre-

grandi crescit. Circa Padoam in montium Euganeorum quedam Ruah dicto.

O Cymum maximum Alexandriacum sive Rhian. Alpini, Jac. Brey. l.c.

Onobrychis spicata fl. pallidis, radiis nullis notaris. Id; ibid. * — *Saxatilis Romana* vel

Speculum veneris Rapunculooides duplex major & minor. Circa Romam & in ipsa Roma,

in veterioribus muris. Præter hanc observavi aliquor species Spaculi veneris vulgo dicti, à G. Bamb.

inter Onobrychides numeratas, quæ formam Rapunculorum Saxatilium exactè referebant, nunc mi-

nores, nunc majores. Eadem floribus calcari longo donatis. Ibid. * Ead. fl. albis, Ibid. * Ead.

fol. strictiss. * Ead. fol. latis ibid. v. Rapunc. Saxar.

Ononis parva lutea. Circa Bononiam ad montem Baderni * Eadem in Ononidem sine flore vel

non florentem degenerans. Ibid. * *Ononis* varia abortiva ibid. * — fl. alb. ibid.

Ophrys minima fl. purpureo — croceis. In scopulo Alpestri Mittenvvaldensi, cuius mentione facta

sub *Dentaria* Buglioide, v. Tab. 9.

Ophioglossum ratione magnitudinis inter se differre deprehendi in Patria circa Oppidum, natale Für-

stenwaldiam. Minimum ultra unciam cum sua lingua & foliolo non assurgit. Medium vero bis

unciale,

c