

anciale, folium habet longius, & linguam ultra tres uncias excrescentem. Majus, a folium obtinet plus 4. uncias longum & unam cum dimidia latam, lingua in altum satis se erigente. Ibidem quoque trilingua *Ophioglossa*, nec non bilingua reperi. v. Tab. 4.

Orchis & floribus & foliolis tota lutea. In Altissimis Appennini jugū circa Scarpenteriam Italie.

* Eadem purpureis barbulis longioribus (*Tragorchidis species*) ibid. *Varia Orchidum species* non descriptæ mibi iter facienti in Alpibus hinc inde occurserunt. Inter eas quædam sese mihi obtulit binis saltē floribus copiosè inter granina circa Insprugum & Mittenwaldam proveniens, ex genere illarum, que muscam majorem referunt, sed elegantiā colorum incredibili.

Orobanche, hypopitys lutea. In pinastretis sub altissimis Marchie Brand, rædis nascitur. Cum mensibus Mayo & junio erumpit, corpusculum luteum in se contortum, tanquam esset fungulus orbiculari luteus, ostendit. At deinceps ultra Spithamam longa exsurget. Radix sapius ultra longitudinem ulnae in terram demissa radici arbori inheret. Planta cum marcescit, nigrum colorem acquirit, saporemq; ulmarie habet. Notandum, quod talia & similia, hypophytat radicibus proximatum plantarum infixa subinde observaverim. v. Tab. 3.

Orobanche rad. dentata altius radicata fol. & fl. albopurpureis. In Borussia & Marchia frequens terrâ erumpit fertili sub fagi umbrosis, primò instar crista ad terram retortæ; postea major erigitur ut precedens *Orobanche* spithamam exsuperans. Radix squamata & altissime radicata superius surculos emittit, qui intra terram emoriuntur, mediò & supremo surculo extraterram tantum se erigente. v. Tab. 3.

— alia lutea & alia cærulea. In nemoribus Germanie umbrosis sapius visuntur que omnes pertinere videntur ad *Orchides abortivas*.

— parva, radice Coralloide ruberrima. Admiranda naturæ in hac plantula quoq; observantur, dum corallia rubra & colore & specie externâ in hujus plantulae radice efformata ad vivum exemplar conspicuntur. In scopulo Mittenwaldensi, de quo sub *Dentaria buguloide*. v. Tab. 9.

Orobus Americanus luteus, siliquis incanis. Jac. Breyne. *Orchis variegata*. Id. ibid.

PAlma Christi moschum redolens. Circa Bambergam in Germania, Alpibus & aliis locis Italie in prati siccioribus sapius ejusmodi *Orchides* offendit.

— *Spinosa* Brasiliiana Caranaiba Brasilianorum. Jac. Breyne. l. c. * — vinifera Belgarum. Id. ibid.

Papaver Spumeum, sive *Lychnis Sylv.* (Been album vulgo) fl. pleno. Id. ibid.

Parietaria Lipsiensium major latifolia. Circa Croznam in Ducatu Silesiae ad flumen Oderam in locis umbrosis & quereru crescit. Frequenter hac maculam albam in supremo foliorum ostendit, raro cæruleam, qua in minore frequentior est.

Pentaphyllum fragiferum fl. albo. Circa Fürstenwaldiam Patriam ad stagnam Döhm dictum quondam frequens erat. Folia ejus inferiora ad caryophyllate folia accedunt, unde quidam plantam quandoq; tres pedes altam pro Caryophyllata habent.

— — repens flore luteo inter Appennina juga Italie alitur.

— fol. argenteis & splendidis, fl. albō, majus & minus. Illud ultra tres pedes quandoq; ex crescit; hoc verò spithamam non superat. Circa Fürstenwaldiam in nemoribus quercuum & pinastrorum. * Id. Petrazum fl. albo ultrâ tres uncias, non assurgens in Petris Alpium & Appennini provenit.

Peregrin. do mar. Lusitanis. Caapeba. Brasil. in Theat. Bras. p. 515. v. Index.

Petasites parva Saxatilis. In montibus Pistojanis Italie. * — maritima Borussiae. Hanc circa littora paludum marinorum Borussiae observavi, fl. trium ulnarum, albis, fol. oblongis, incanis, diversum planè vultum à vulgari obtinentem.

Phallus maximus. v. *Fungus phalodes &c.*

Phaseolus Indicus fol. Glycyrrhizæ, fl. cæruleo ampio: sive *Flos Clitoridis*. Jac. Breyne. l. c. *Pilosella* fol. latioribus & per omnes partes, major, cæterum communis persimilis. In agris, nemoribusq; temperatis Bavarie, Italie & in Alpibus.

Pimpinella spinosa Cretica. Perelegans plantula olim in Horto Patavino colligebatur, ex Creta & delata; * — *Agrimonioides*. Spontè provenit in Appenninis circa Florenziam. Est autem planè alia planta bac & *Agrimonioides* Columna, quas C. B. commisceret.

Pipî Brasil. Th. Bras. p. 299. arbusculæ ramus, circa quem dependent bacca Berberibus similes, paulò tamen majores, rubra, quadam cærulea, purpurascentes. Folia illimi sunt. Videtur species Pipera cujusdam.

Planta lactaria Africana, Pini fructuum facie. Jac. Breyne. l. c.

Plantago latifolia major, marginibus foliorum exiguum dentatis. In pluribus Germanie locis & maritimis. * — media fol. laciniatis. Ibid. * — foliis ex pericarpis proliferis in locis temperatis, & apricis Germanie. Ad naturam plantaginu rosea accedens videretur.

— Spick