

3. *G. bupleuaria*. W. V. (H. 8. H. S. III. 10. Hdr. 61.) Verbreitet, im Oberlande weniger gemein, wie in der niederen Gegend, wo er auf trockenen, sonnigen Waldblößen nicht selten fliegt. Ende Juni und Juli. Rpe. auf Schafgarbe, *Achillea millefolium*, Johanniskraut, *Hypericum perforatum*, Schotenklee, *Lotus corniculatus*, Quendel, *Thymus serpyllum*. Herr Seyffert fand sie auch an Ahorn, sowie er den Schmetterling aus einer an einem Pflaumbaumstamm gefundenen Puppe erzog.

4. *G. viridaria*. H. (H. 11. H. S. III. 10. Hdr. No. 62.) Dem eigentlichen Oberlande fehlend, Lauban 662' (W.) scheint der höchste Flugort zu sein. In der eigentlichen Haidegegend nicht selten. Fliegt in gemischten Wäldern und auf Waldblößen im Juni. Rpe. im August auf Birken, Haseln, Eichen, Weißdorn, Brombeeren.

5. *G. putataria*. L. (H. 10. H. S. III. 11. Hdr. No. 67.) Im Oberlande und zwar im südlichsten Theil desselben nicht selten. In Wäldern, Mai, Anfang Juni. Rpe. auf Buchen und Erlen.

7. *G. aeruginaria*. W. V. (H. 46. H. S. III. 11. Hdr. No. 68.) Verbreitet und in gemischten Waldungen überall sehr gemein. Mai und wieder Ende Juni. Erstere aus verspäteten überwinterten Puppen. Rpe. im Juni auf Birke.

145. *Pseudoterpna*. Hübn. (*Geometra* Tr.)

1. *Ps. cytisaria*. W. V. (H. 2. H. S. III. 11. Hdr. No. 71. *Geometra cytisaria*.) Verbreitet und mehr oder weniger selten in Nadelwäldern Ende Juli, August. Rpe. im Juni auf Besenpfrieme, *Spartium scoparium*, Geißklee, *Cytisus nigricans*; Ginster, *Genista pilosa et tinctoria*.

146. *Acidalia*. Tr. (*Idaea* Tr. *Cabera* Tr. *Enommos* Tr. *Fidoia* Tr.)

1. *Acid. amataria*. L. (H. 52. H. S. III. 13. Hdr. No. 637. *Idaea amataria*.) Ueberall sehr gemein auf Wiesen, Feldern, in Laubhölzern. Mai, Anfang Juni und wieder im Juli und August. Rpe. auf Ampfer, *Rumex*, Knöterich, *Polygonum*. Juni, August, September.

2. *Acid. vibicaria*. L. (H. 50. H. S. III. 13. Hdr. No. 635. *Pellonia vibicaria*.) Verbreitet, aber immer nur einzeln auf sonnigen, trockenen Waldwiesen. Ende Juni, Juli. Rpe. im Mai auf Quendel, Dosten, *Origanum vulgare*, Besenpfriemen, *Spartium scoparium*.

3. *Acid. scutularia*. H. (H. 72. H. S. III. 15. Hdr. No. 706. *Idaea scutularia*.) Verbreitet und nicht selten auf Waldwiesen, an Brettwänden. Ende Juni, Juli.