

14. *Acid. sylvestraria*. *Borkh.* (H. 97. H. S. suppl. 103—105. Hdr. No. 645. *Idaea sylvestraria*.) Nicht selten auf Waldwiesen, in Laubhölzern. Juli, August.

15. *Acid. commutaria*. *Tr.* (H. S. suppl. 91—96. H. S. III. 22. Hdr. No. 647. *Idaea commutata*.) Bisher nur bei Lichtenau bei Lauban Gneiß 662' (W.) und auf dem Dybin bei Zittau, Quadersandstein 1591' (Chr.) gefangen.

16. *Acid. remutaria*. *L.* (H. 98. H. S. suppl. 86—90. H. S. III. 22. Hdr. No. 684. *Idaea remutaria*.) Wohl verbreitet, Zittau, St. Lauban (W.) In der Haidegegend gemein in Wäldern. Ende Mai, Anfang Juni. Die Ape. wird außer auf Waldmeister wohl noch auf anderen Pflanzen leben, denn jener wächst wenigstens um Särichen nicht, wo der Spanner sehr häufig flog. Ape. im Spätherbst.

17. *Acid. immutaria*. *H.* (H. 108. H. S. suppl. 101. H. S. III. 22. Hdr. No. 690. *Idaea immutaria*.) Scheint verbreitet zu sein, wurde aber erst bei Lauban 662' (W.) und bei Saritzsch, unterhalb Baugen, (Tr.) gefunden. Ende Mai, August.

18. *Acid. immoraria*. *L.* (H. 133. H. S. III. 25. Hdr. No. 246. *Fidonia immoraria*.) Scheint mehr dem Oberlande eigen zu sein und der Haide zu fehlen. Rothstein bei Sohland 1395'. Basalt. Kämpfenberg bei Königshain, 1243'. Granit, (Chr.) Lauban 662' Gneiß (W.) Auf Waldwiesen. Juni, August. Ape. nach Freyer auf Haide, *Erica vulgaris*.

19. *Acid. exemptaria*. *H. V.* (H. 109. *Strigillaria*. H. S. suppl. 108. 109. *Prataria*. H. S. III. 26. *Prataria*. Hdr. No. 640 *Idaea prataria*.) Ich besitze ein einziges in der Lausitz gefangenes Exemplar, dessen Fundort ich jedoch nicht mit Bestimmtheit anzugeben vermag. Juli.

20. *Acid. paludata*. *L.* (H. 70. *Ornataria*. H. S. III. 25. *Ornataria*. Hdr. No. 720. *Idaea ornataria*.) Ueberall auf Waldwiesen ziemlich häufig. Juni, Juli. Ape. Ende Mai auf Quendel, *Thymus serpyllum*.

21. *Acid. flaveolaria*. *H.* (H. 341. H. S. III. 27. Hdr. No. 340, *Acidalia flaveolaria*.) Bisher nur sehr selten im Niederlande bei Nisky 541' (Chr.) gefunden.

22. *Acid. auroraria*. *H.* (H. 63. H. S. III. 27. Hdr. No. 222. *Fidonia auroraria*.) Ziemlich verbreitet, doch nur einzeln und selten. Juli und August auf Waldwiesen. Herrnhuth 1054' Granit, Kämpfenberg bei Königshain 1248' (Gzornebog bei Cunewalde 1758') Granit, Nisky 574' (Chr.) Ape. im Juni an Wegerich, *Plantago*.

23. *Acid. emarginaria*. *L.* (H. 107. H. S. III. 28. Hdr. No. 13 *Enommos emarginaria*.) Ueberall in Laubhölzern, an Waldrändern im