

in Görlitz 660' und Lauban 662' (W.) wohl seine tiefste Grenze findend. In Nadelwäldern. März, April. Die Pp. soll auf Espen (*Populus tremula*) leben, was mir, mit den Flugarten des Falters verglichen, unwahrscheinlich ist; ich vermuthe sie eher auf Heidelbeeren oder dergl.

161. **Phasiano.** *Dup.* (*Aspilatis. Tr.*)

1. *Phas. petraria. H.* (H. 113 H. S. III. 58. Hdr. No. 100. *Aspilates petraria.*) Nur dem Niederlande eigen, in Görlitz (660' H.) wohl seine höchste Fluggrenze findend. Misky 574' (Chr.) in manchen Jahren gemein. Ende Mai.

162. **Hibernia.** *Latr.* (*Fidonia. Tr.*)

1. *Hib. defoliaria. L.* (H. 182. H. S. III. Hdr. No. 287. *Hib. defoliaria.*) Verbreitet, der Falter nicht so häufig, wie die Raupe. In Gärten, Laubhölzern. Oktbr., Novbr. Pp. Ende Mai, Juni auf Birke, andern Laubhölzern und Obstbäumen.

2. *Hib. aurantiaria. Esp.* (H. 184. H. S. suppl. 351. H. S. III. 60. Hdr. No. 285.) Bisher nur in einem kleinen Theil des südlichen Oberlandes gefunden. Selten. Sommerau bei Zittau 763' (Sft.) einmal aus der Raupe gezogen. Oktbr. Pp. im Juni auf Eberesche, *Sorbus aucuparia.* Die Pp. lebt auch auf Eichen, Birken und Schlehen.

3. *Hib. progremmaria. H.* (H. 183. H. S. suppl. 346. 347. H. S. III. 60. Hdr. No. 286.) Wohl verbreitet, doch erst an wenigen Orten beobachtet. Nieder-Friedersdorf bei Neusalza (Granit, v. S.) ziemlich selten und in der eigentlichen Haidegegend, um Misky (574') in manchen Jahren nicht selten an Lindenstämmen zu finden. Ende Febr. bis Anfang April, auch schon in einzelnen Exempl. im Oktbr., Novbr. Pp. im Juni auf Eichen, Linden, Schlehen, wilden Rosen.

4. *Hib. leucophaearia. W. V.* (H. 195. 181. H. S. suppl. 350. Hdr. No. 290.) Bisher nur in einem kleinen Theil des eigentlichen Oberlandes gefunden. Selten. Herrnhuth (1054', Granit.) Zittau (763', Sft.) März. Pp. im Mai und Juni auf Eichen.

163. **Angerona.** *Dup.* (*Enommos. Tr.*)

1. *Ang. prunaria. L.* (H. 122. 123. 566. H. S. III. 63. Hdr. No. 29. *Enommos prunaria.*) Verbreitet, doch nicht häufig, in Laubhölzern, Juni, Anfang Juli. Pp. im Mai auf Pflaumenbäumen, Schlehen, Geißblatt (*Lonicera*), Hainbuchen, Rüstern, Haseln, Flieder (*Syringa vulgaris*), Besenpfriemen, *Spartium Scoparium.*