

gebirge gegen Böhmen ca. 2000' (Sft.) Phonolith und Basalt. — Niederland: Lichtenau bei Lauban 662' (Gneiß. W.) Herrnhuth 1054' einmal.

168. Gnophos. Tr.

1. Gnoph. dilucidaria. H. (H. 143. H. S. III. 73. H. S. suppl. 71. Hdr. No. 128.) Bisher nur im südlichsten Theil des Oberlandes, im Grenzgebirge gegen Böhmen. — Phonolith, Basalt ca. 1800—2000' gefunden. In Nadelwäldern, an Steinen. Seyffert. August. Ich besitze durch Herrn Seyffert zwei Exemplare, das eine aus dem Haingrunde in der Nähe des Hochwaldes, das andere vom Scharfenstein.

2. Gnoph. pullaria. H. (H. 145. H. S. suppl. 70. H. S. III. 74. Hdr. No. 131.) Erst zweimal, auf dem Gipfel des Löbauer Berges, Nephelindolerit 1374' von Christoph und bei Misky 574' Haidegegend von demselben gefunden. Juli.

3. Gnoph. glaucinaria. H. (H. 150. H. S. suppl. 68. 69. H. S. III. 75. Hdr. No. 132.) Im vorigen Jahre wurde diese, bisher wohl nur in den Alpen gesammelte Art von Herrn Lehrer Seyffert auf dem Dybin bei Zittau — Quadersandstein, Ende Juli, 1597' — in zwei schönen weiblichen Exemplaren, von denen ich das eine besitze, gefangen. Juli.

4. Gnoph. obscuraria. W. V. (H. 146. H. S. III. 74. Hdr. No. 124.) Ziemlich verbreitet und in manchen Jahren, besonders im Niederlande, nicht selten. An Steinen sitzend. Juli, August. Rpe. im Mai und Juni auf Brombeeren und Beifuß.

169. Boarmia. Tr. (Gnophos Tr. Zerene. Tr.)

1. Boarm. abietaria. W. V. (H. 160. H. S. III. 79. Hdr. No. 152.) Verbreitet und in einigen Theilen des Oberlandes, wie z. B. auf der Tafelfichte 3466' — von wo er sich in gleicher Häufigkeit bis in das Riesengebirge findet. In Nadelwäldern. Juli. Rpe. nach Esper auf Tanne, Pinus Abies. Koch vermuthet ihre Nahrungsmittel in der Him- oder Brombeere.

1. Boarm. secundaria. W. V. (H. 156. H. S. suppl. 247. H. S. III. 80. Hdr. No. 162.) Scheint nur dem Oberlande anzugehören und in Lauban 662' Gneiß (W.) seinen tiefsten Flugort im Gebiet zu haben. In Nadelwäldern, doch überall nur einzeln. Zittau, Diluvium 763' (Sft.) Dybin 1597' Quadersandstein, Meißthal bei Hirschfelde 662' Granit (Sft.) Nieder-Friedersdorf bei Neusalza ca. 7—800' Granit (v. S.) Herrnhuth 1054' Granit. Juli. Rpe. im Mai und Juni auf Pinus sylvestris. (Kiefer.)