

3. Boarm. cinctaria. W. V. (H. 166. H. S. III. 80. Hdr. No. 144.) Überall gemein in Nadel- und Laubwäldern, an Bretzäunen u. s. w. April, Mai. Rpe. im Juni, Juli auf Heide, Calluna vulgaris, Schafgarbe, Achillea millefolium, Besenpfriemen, Spartium Scoparium. Ob eine zweite Generation im Juli stattfindet, möchte zu bezweifeln sein; einzelne, abgeslogene Exemplare, welche wir in diesem Monat fanden, waren jedenfalls nur Spätlinge.

4. Boarm. consortaria. H. (H. 168. H. S. III. 80. Hdr. No. 151.) Verbreitet, doch überall nur einzeln. Die Schmetterlinge in Laubwäldern, Gärten. Mai. Rpe. August, September auf Schlehen, Himbeersträuchern, Gelängerjelieber, Lonicera xylosteum.

4. Boarm. roboraria. H. (H. 169. — 152. Consobrinaria. H. S. III. 81. Hdr. No. 150.) Ebenfalls verbreitet, doch nur einzeln. In Wäldern, Parkanlagen. Mai, Juni. Rpe. April bis Anfang Mai auf Eiche.

6. Boarm. repandaria. H. (H. 161. H. S. III. 81. Hdr. No. 153.) Überall gemein in Nadelwäldern. Juni, Juli. Rpe. im April und Mai an Lonicera Periclymenum, Wermuth, Artemisia Absinthium, von Herrn Seyffert auch an Eberesche, Sorbus aucuparia gefunden.

Var. conversaria. H. (H. 320. 393. Hdr. No. 154.) Zweimal von mir in einem Garten gefangen. Juli. Herrnhuth 1054'.

7. Boarm. consonaria. H. H. 157. H. S. suppl. 246. H. S. III. 82. Hdr. No. 146.) Bisher nur bei Lichtenau bei Lauban 662' Gneiß (W.) und bei Zittau 763' Diluvium. (Sft.) gefunden. An ersterem Orte nicht selten. In Nadelwäldern. Mai.

8. Boarm. crepuscularia. W. V. (H. 158. H. S. suppl. 389. H. S. III. 82. Hdr. No. 147.) Verbreitet und im Niederlande stellenweise nicht selten. In Wäldern. April, Juli. Rpe. Juni, September, Oktober auf Besenpfrieme, Spartium Scoparium. Gänsefuß, Chenopodium. Saalweiden, Erlen, Pappeln.

9. Boarm. lichenaria. H. (H. 164. H. S. III. 82. Hdr. No. 173.) Verbreitet, doch nicht sehr häufig, in Wäldern, an Brettwänden u. s. w. Juni bis Anfang August. Rpe. im Mai an Wand- und Baumflechten, Gartenzäunen.

10. Boarm. viduaria. H. (H. 163. 364. H. S. III. 81. Hdr. No. 175.) Scheint verbreitet, bisher aber nur bei Lauban und Lichtenau (662') Diluvium, Gneiß (Pr. W.), Hochwald bei Zittau, Basalt, 2351' (Sft.) einzeln gefangen. Mai, Juni. In Laubwäldern. Rpe. wohl an den Flechten der Eichen oder Buchen.