

11. Boarm. glabraria. *H.* (H. 162. 339. 348. Teneraria. H. S. III. 81. Hdr. 174.) Wohl verbreitet, wie die beiden sehr entfernten Fundorte vermuthen lassen. Lichtenau bei Lauban, Gneiß 662' (W.) Nieder-Friedersdorf bei Neusalza, Granit. 7—800' (v. S.) Einzeln in Wäldern. Juli. Rpe. im Juni und Anfang Juli auf Lichen omphalodes und Bartflechte, *Usnea barbata*.

12. Boarm. punctularia. *H.* (H. 317. H. S. III. 83. Hdr. No. 139. Gnophos punctularia.) Verbreitet und besonders im Oberlande gemein. In Wäldern an Baumstämmen sitzend. April, Mai. Rpe. im Juni und Juli auf Erle und Birke.

13. Boarm. adustaria. *H.* (H. 75. H. S. III. 83. Hdr. No. 601. Zerene adustaria.) Nirgends selten. In Gebüsch, Gärten, an Hecken. Anfang Mai, Juni, Juli bis Anfang August. Rpe. Juni und September, Oktober, auf Spindelbaum, *Evonymus europaeus*.

170. Cabira. *Tr.*

1. Cab. pusaria. *L.* (H. 87. H. S. III. 84. Hdr. No. 311.) Ueberall in Laubhölzern sehr gemein. Mai, Ende Juni, Juli. Rpe. Juni, August, September auf Birken, Weiden, Erlen, Buchen.

2. Cab. exanthemaria. *Esp.* (H. 88. 506. Striaria. H. S. III. 85. Hdr. No. 315.) Ebenfalls verbreitet und gemein in Laubhölzern. Mai, Anfang Juni, Ende Juli, August.

171. Perconia. *Hüb. Verz.* (*Aspilates. Tr.*)

1. Perc. strigillaria. *H.* (H. 125. 540. 541. H. S. III. 85. Hdr. No. 91. 6. *Aspilates strigillaria*.) Bisher nur in der eigentlichen Haidegegend, wo er z. B. bei Nisky, 574' auf dürrer Sandboden in lichten Kiefernwäldern nicht selten fliegt. Juni. Die Rpe. nach (H. S.) auf Vogelwicken, ich vermuthete sie auch auf Genista oder Geißflie, *Cytisus nigricans*.

172. Fidonia. *Tr.* (*Zerene. Tr.*)

1. Fid. melanaria. *L.* (H. 86. H. S. III. 64. Hdr. No. 232.) Nur der eigentlichen Haidegegend angehörend und auch dort nur auf einzelne Plätze beschränkt, wo er in lichten Nadelwäldern stellenweis häufig fliegt. Nisky 574' an zwei Stellen, bei Siwah und bei dem Wartthurm. In dem Trebuser Forst bei Nisky an einer Stelle zuweilen häufig. Särichen bei Nisky. Juni, Juli. Spätlinge nach Anfang September. Rpe. jedenfalls auf einer *Vaccinium*-Art oder auf Sumpfsorst, *Ledum palustre*.

2. Fid. wavaria. *L.* (H. 55. H. S. III. 88. Hdr. No. 256.) Verbreitet, doch ziemlich einzeln, in Gärten, um Hecken. Ende Mai, Juni