

23. *Larent. rivaria*. *H.* (H. 409. H. S. III. 151. Hdr. No. 579. *Cidaria rivaria* — *ata.* *Tr.*) Wenig verbreitet, erst bei Lichtenau bei Lauban (662' Gneiß) (*W.*) gefunden. Selten. Juni, Juli. *Rpe.* auf Labkraut, *Galium verum*.
24. *Larent. montanaria*. *W. V.* (H. 248. H. S. III. 152. Hdr. No. 555. *Cidaria montanaria.* *Tr.*) Verbreitet, am häufigsten im gebirgigen Theile des Oberlandes. Juni, Juli. *Rpe.* im Mai an Nesseln, *Urtica urens*, und Ampfer, *Rumex*, (*Sft.*)
25. *Larent. procellaria*. *W. V.* (H. 251. H. S. III. 155. Hdr. No. 591. *Zerene procellaria.* *Tr.*) Erst einmal in Nieder-Friedersdorf bei Neusalza (7—800 Granit) (*v. S.*) gefangen. Die *Rpe.* soll auf Waldrebe, *Clematis vitalba*, leben. Ob diese Pflanze in jener Gegend vorkommt, ist mir unbekannt.
26. *Larent. albicittaria*. *L.* (H. 76. H. S. III. 154. Hdr. No. 604. *Zerene albicillaria* — *ata.* *Tr.*) Verbreitet doch nicht gemein in Gärten, Laubgebüsch, an Hecken. Ende Mai, Juni. *Rpe.* im August auf Himbeer- und Brombeersträuchern.
27. *Larent. rubiginaria*. *W. V.* (H. 250. H. S. III. 155. Hdr. No. 600. *Zerene rubignaria* — *ata.* *Tr.*) Verbreitet, doch ziemlich selten, in Gebüsch, an Hecken. Juli, August. *Rpe.* Ende Mai auf wilden Rosen, *Rosa canina*.
28. *Larent. blandiaria*. *W. V.* (H. 258. H. S. suppl. 290. 291. H. S. III. 153. Hdr. No. 599. *Zerene blandiaria* — *ata.* *Tr.*) Verbreitet, nicht sehr häufig, in Laubgebüsch, auf Waldwiesen. Juli.
29. *Larent. albularia*. *W. V.* (H. 257. H. S. III. 157. Hdr. No. 349. *Acidalia albularia* — *ata.* *Tr.*) Verbreitet, auf Waldwiesen im Grase, stellenweis nicht selten. Mai, Anfang Juni.
30. *Larent. rivularia*. *W. V.* (H. 259. H. S. suppl. 289. H. S. III. 157. Hdr. No. 374. *Acasis rivularia*, *Acidalia rivulata.* *Tr.*) Verbreitet, in Laubgebüsch, Parkanlagen nicht selten. Juli. *Rpe.* im August auf Hohlzahn, *Galeopsis tetrahit*.
31. *Larent. luctuaria*. *W. V.* (H. 253. H. S. suppl. 321. H. S. III. 156. Hdr. No. 588. *Cidaria luctuaria* — *ata.* *Tr.*) Verbreitet und besonders im Oberlande auf Bergen, stellenweis nicht selten. In Laubwäldern. Juli.
32. *Larent. hastaria*. *L.* (H. 256. 356. H. S. III. 156. Hdr. No. 586. *Cidaria bastaria* — *ata.* *Tr.*) In der eigentlichen Haidegegend, um Nisky (574') in lichten Kieferwäldern, zuweilen stellenweis nicht selten. Juni bis Anfang August. *Rpe.* im August auf Birke, Erle. Fliegt auch bei