

*Triphaena janthina*. F. (H. 100. H. S. II. 328.) Einmal im vergangenen Jahre bei Herrnhuth (1054' Granit) gefangen. Juli. Raupe auf niederen Pflanzen.

Pag. 318. 84.

*Agrotis xanthographa*. W. V. (H. 138. H. S. II. 341.) Einmal bei Nieder-Friedersdorf bei Neusalza (Granit 7—800') (v. S.!) gezogen. September. Rpe. auf niederen Pflanzen.

*Herminia tarsicrinalis*. Knoch. 324. 90. Verbreitet. Zittau. (Stt.!), Misky (Chr.!) Juni. Selten.

*Plusia ain*. Esp. 324. 90. Auch einmal bei Zittau (763') gefangen. (Stt.!) Ndr.-Friedersdorf. (v. S.!)

Als neu für die Fauna sind einzuschalten 325. 91.

*Plusia concha*. L. H. 287. 458. H. S. II. 398.) Vor einigen Jahren in Mehrzahl von Kreischer in einem Garten in Berthelsdorf bei Herrnhuth (1054' Basalt) gefunden. Juni, Juli. Die Nahrungspflanzen der Raupe, *Aconitum* und *Thalictrum*, wachsen in diesem Garten.

*Plusia moneta*. F. (H. 189. 773. 775. H. S. II. 401.) Verbreitet, mehr oder weniger gemein. Juni, Juli. Rpe. in Gärten an *Aconitum*. Diese Art war in der Fauna aus Versehen ausgelassen.

*Erastria candidula*. W. V. 325. 91. Auch im Oberlande. Ndr.-Friedersdorf. (v. S.)

*Catocala electa*. B. 325. 91. Fliegt nicht bei Baugen. (S.!)

*Catocala sponsa*. L. 326. 92. Zittau (763') (Stt.!), Horfa bei Misky (Hol.!)

*Agrophila sulphurea*. W. V. 329. 95. Särichen, Dretschen. (Ro.)

*Hypaena obesalis*. Tr. 328. 94. Zittau (763') von Seyfferth in einigen schönen Exemplaren gezogen. Rpe. auf Nesseln.

*Sophronia emortualis*. W. V. 329. 95. Auch im Oberlande. Ndr.-Friedersdorf bei Neusalza (7—800' Granit (v. S.!)

*Cledeobia acuminata*. H. S. 329. 95. Fliegt nicht bei Lauban, sondern bei Sohra bei Görlitz. (W.)

Bei den Gramminen, Tortricinen und Tineinen sind folgende neun für die Fauna neue Arten einzuschalten:

*Hypochoalcia melanella*. Tr. (H. S. IV. 86. Suppl. 72. 73. Hdr. No. 238.) Einzeln bei Ndr.-Friedersdorf bei Neusalza (Granit 7 bis 800') (v. S.!) und bei Dretschen bei Neukirch (Diluvium (5—600') (Ro.!) gefangen. Mai.