

CAPUT VI.

*Quomodo præcipue Stellarum Affectiones
cognoscendæ?*

TABELLA de præcip. Stell. Affectionibus.

Affectiones Stellarum sunt ratio- ne motus	Secundi, relatæ ad	Eclipticam. Sic est	Longitudo.	Utræq; { Septentrionalis. Meridionalis.
		Æquatorem. Sic est Declinatio.	Latitudo.	
vel	Æquatorein. Est Astrono- micus	Ortus, seu Ascensio	tum { Recta. Obliqua.	Diurnus s. generalis. Annus s. { Cosmicus. Specialis { Chronicus. Apparens annuus s. Heliacus.
		Occasus, seu Descensio		
Primi, relatæ ad	Horizon- tem. Est yulgaris	Verus	Diurnus s. generalis.	Annus s. { Cosmicus. Specialis { Chronicus. Apparens annuus s. Heliacus.
		tum	Annus s. { Cosmicus. Specialis { Chronicus. Apparens annuus s. Heliacus.	

Oronidis loco jam breviter ostendere placet, quomodo præcipue, stellarum fixarum atque erraticarum affectiones, adjuncto schematismo comprehensæ, per hunc Viceglobum examinari, addiscig; possint.

LONGITUDO stellæ est ejus distantia à principio V in consequentiam seu s. f. f. numerata. Hanc Planisphær. partis boreal. latera 4. circumcirca descriptam numerant. Unde regula ad centrum (polum) Eclipticæ applicata, & stellam, cuius longitudine quæritur, transiens in latere signum & gradum facile monstrat. In 2. Zodiacal fronte & calce (latere superiore ac inferiore) notatur. Unde per regulam ritè applicatam eodem modo colligitur.

LATITUDO stellæ est ejus distantia ab Ecliptica versus polum ejus alterutrum indeq; vel borealis vel australis. Hæc in parte Bor. à polo Eclipticæ ad latera numeratur. Unde circini crure in