

VERZEICHNIS
DER
MERKWÜRDIGSTEN INSECTEN
WELCHE
IM PLAUISCHEN GRUNDE
GEFUNDEN WERDEN.

Claff. I.
ELEUTERATA.

Scarabaeus. Dungkäfer.
a. Scutellati.

1. *Capite et thorace cornuto.*

S. Typhoeus.
Vorzüglich zwischen Potschappel und Tharand.

S. nasicornis.
In der Gegend von Potschappel, wo er wahrscheinlich in den Treibeeten des herrschaftlichen Gartens seine Verwandlung übersteht.

S. mobilicornis.
Selten. Ich habe ihn nie anders als im Junius gegen Abend im Fluge gefangen. Durch mehr als zehn Abänderungen und allmähliche Uebergänge, in Rücksicht auf Farbe und Bildung der Hörner auf Kopf und Bruststück, glaube ich beweisen zu können, daß der in der F. G. aufgeführte Sc. testaceus, nichts als Varietät dieses Käfers ist.

2. *Thorace inermi, capite cornuto.*

S. subterraneus.
S. Fossor.
S. Scrutator.
S. terrestris.
S. bimaculatus. *Selten.*
S. putridus.
S. erraticus.

S. conspurcatus.
S. inquinatus.
S. luridus.
S. haemorrhoidalis.

3. *Mutici, capite et thorace inermi.*

S. sylvaticus. *Bei Tharand.*
S. rufipes.
S. nigripes.
S. contaminatus.
S. quadrimaculatus.
S. Sus. *Selten.*
S. minutus.
S. testudinarius.
S. quisquilius.
S. Pecari. *Selten.*
S. porcatus.
S. asper.
S. depressus. *Z.*

b. *Excuteuati.*

1. *Capite et thorace cornuto.*

S. lunaris.
S. Emarginatus.
Bloße Abänderung des lunaris.
S. Lemur. *Selten.*
S. Camelus. *Selten.*

2. *Capite cornuto, thorace inermi.*

S. Vacca.
Eine große Anzahl dieses nicht gemeinen Käfers, hat beträchtliche Abweichungen sowohl in

Farbe und Größe, als auch in Bildung des Kopfs und Bruststückhorns. Alle aber kommen in der Punctirung des Bruststücks überein, indem die Punkte alle von den Flügeldecken nach dem Kopfe zu eingestochen sind, wodurch er sich auch beständig von dem ihm ziemlich ähnlichen Coenobita unterscheidet.
S. Coenobita. *Nicht gemein.*
S. fracticornis Preisleri. *P. F. G. Selten.*
S. Xiphias. *Selten.*
S. nutans.

3. *Mutici.*

S. Schreberi.
S. Schaefferi. *Sehr selten.*
S. ovatus.

Hister. Stutzkäfer.

H. unicolor.
H. semipunctatus.
H. duodecimstriatus.
H. planus.
H. quadratus Kugelann. *P. F. G. Sehr selten. Ich fand ihn stets unter Stämmen in Gesellschaft der Formica vagans, mit welcher man ihn leicht verwechselt, wenn man nicht sehr aufmerksam ist. Er läuft sehr schnell.*